


XXVIII

7
0

BIBLIOTECA NAZ.
Vittorio Emanuele II
XXVIII
F
30
LI



XXVIII
F
30

TOURNEFORTIUS
CONTRACTUS,

SUB FORMA

TABULARUM

SISTENS

INSTITUTIONES
REI HERBARIÆ

JUXTA METHODUM MODERNORUM,

CUM

LABORATORIO

PARISIENSI

EJUSDEM AUTORIS.

ACCEDIT

MATERIA MEDICA

A PAULO HERMANNO

IN CERTAS CLASSES CHARACTERISTICAS REDACTA,

CUM

DUPplici SCHEMATISMO,

EXCURSIONIBUS BOTANICIS ET HERBARIIS VIVIS
CONFICIENDIS INSERVIENTE.

ACCURANTE

CHRISTOPHORO BERNHARDO VALENTINI.

M. B. FIL.

FRANCOFURTI AD MOENUM.

PROSTAT APUD JOHANNEM PHILIPPUM ANDREÆ.

ANNO MDCCXV.





P R Æ F A T I O.



Otanicorum Studium ipsamque Rem Herbariam à tempore *Dioscoridis* exiguum vel omnino nullum incrementum sumsisse, non sine causâ suo quondam tempore conquestus est *Helmontius*. Nostreis verò annis si rediret nunquam satis laudandum hoc Scholarum suscitabulum, nullus dubito, quin de statu Herbariorum ex-

clamaturus sit:

quantum mutatus ab illo!

Equidem negari nequit Antiquissimos, circa corticem magis quàm nucleum versando, de solis nominibus, non verò de solidâ & distinctâ herbarum notitia fuisse sollicitos, ut è *Galenii*, *Aetii*, *Aeginete*, *Plinii*, aliorumque scriptis elucescit: & quamvis genuinus *Plinii* interpres *Dalechampius*, ut & *Dodonaus*, *Ruellius*, *Spigelius* fratresq; *Bauhini* exactiorem plantarum historiam meditati partim, partim & aggressi sint, è tanto tamen Labyrintho se extricare non potuerunt, quum filo Modernorum *Ariadnæ* destituti nil nisi Chaos informe & scopas ferè dissolutas posteris reliquerint. Quamprimum verò *Fabius Columna* & *Andreas Cæsalpinus* tot plantarum myriadas ad certas classes certa que genera reduxerunt, eorumque vestigia *Morisonus*, *Rajus*, *Hermanus*, *Ammannus*, *Rivinus*, *Tournefort*, & alii pressius secuti sunt, dici non potest, quanta nunc facilitate, quantoque compendio vastissimus rei herbariæ campus absolvi & percutri possit; & quamvis adhuc aliqua in methodo illorum discrepantia occurrat, ita ut hi genera plantarum è floribus, illi ex seminibus eorumque capsulis, isti mox è floribus, mox è seminibus & fructibus, alii denique ex omnibus simul partibus sumenda esse suadeant, discrimen tamen illud ita comparatum est, ut ceu bivia aut trivium ad regiam tandem viam redeuntia ad eundem Botanophilos scopum, h. e. solidam plantarum notitiam & dignotionem, deducere valeant. Hodegi loco servient *Institutiones Rei Herbariæ Josephi Pitton de Tournefort*, *Aquisgranensis*, Doctoris Medici Parisiensis, Academiae Regiæ Scientiarum Socii, & in Horto Regio Botanices Professoris, qui solertia laboreque indicibili notas plantarum características in figuris aeneis politissimis tam clarè & distinctè omnium oculis exposuit, ut fungum pro cerebro & peponem pro corde habere dixeris, qui non statim è primò illarum intuitu hanc Modernorum methodum addicere, plantarumque genera ex amissi distinguere valeat, dummodo vulgarium & communis officinalium notitiam, per crebriores Excursiones Botanicas & autopsiam, sibi prius comparaverit.

Quan-

Quandoquidem verò liber hic ita comparatus sit, ut partim ob nimum, quo venit, pretium ab omnibus Philiatris minus coëmi, partim ob utriusque voluminis molem in excursionibus Botanicis, quas Herbatones vocant, ruri per montes, sylvas & campos absque molestia circumportari non possit; hinc filio meo, natu majori, *Christophoro Bernhardo Valentini*, animum ad studium hocce applicanti, nuper autor fui, ut nucleum & medullam quasi extrahendo quasvis Plantarum Classes ex Autore sic in Tabulis disponderet, ut uno statim intuitu omnibus illarum generibus (literis obliquis seu cursivis expressis) ob oculos positis species subalternatæ (hinc inde quoque adjectæ) eò facilius addisci & distingui possint. Ne verò sterilis sit comparata inde plantarum notitia, suasi insuper, ut notas characteristicas, quæis universam Materiam Medicam distinxit Celeberrimus *Paulus Hermannus* in *Collegio MSC.* à multis in pretio habito, similibus in Tabulis distingueret, ut simul plantarum vires, à *Simone Paulli* in *Quadripartito Botanico* & *Joh. Rajo* in *Historia Plantarum* longè elegantius quàm in Herbariis *Theodori Tabernamontani*, *Matthioli*, *Loniceri*, *Tragi*, *Lobelsii*, *Pancovii*, aliorumque traditas, addiscere & in futurum usum medicum sibi firmiter imprimere valeret. Utroque instituto hoc ex voto succedente, permisi tandem ut *Preparationes Chymicas*, à *Turnesfortio* in Collegio publico olim traditas, cum annotationibus & ætiologiis à me adjectis, subjungendo panopliam quasi traderet, quâ medicamentis probatissima è simplicibus, in Tabulis enumeratis, solidè & rationabiliter preparari & in Praxi denum feliciter applicari possint ac debeant. *Figura anea* per adscripta nomina seipsas explicabunt, exceptâ fortè majore in Tab. 1. ubi Partes Florum sistuntur in Flore Coronæ Imp. ita ut Num. 1. 2. 3. 4. 5. 6. designata *petala* alimentum capiant à *pedunculo* Nuni. 7. illudque instar viscerum perficiendo *fructus* nascenti Num. 8. suppedirent: ineptis humoris partibus per *stamina* seu vasa excretoria Num. 9. 10. 11. 12. 13. 14. abeuntibus in *apices* seu receptacula 15. 16. 17. 18. 19. 20. quæ circumponuntur *pistillo* hic extra florem eminenti. Tandem *calyx* nihil aliud est, quam basis & nodus inferior florem firmans & defendens quasi ab injuriis externis: neque aliud est, quam productio exterioris tunicæ in germine. His observatis plantarum characteres eorumque descriptiones, cuilibet Classi & Sectioni ab Autore præmissæ, facile poterunt intelligi. Ut verò in plantis spontè pullulantibus inquirendis & colligendis eò felicius progredi, earumque locum natalem & florendi tempus accuratius observare possint Botanophili, addimus pro coronide duplicem Tabulam, quarum altera è *Laurembergio* & *Simone Paulli* formata, altera autem à Celeberrimo quondam Medico, *Theophilo Kentmanno*, consignata, & Anno 1609. Gissæ Hassorum correctius & auctius edita est: quæ utraque cum utilitate, tum raritate LECTORI BENEVOLO se facile commendabit, quem cum omnigenæ prosperitatis appreciatione his optime valere jubeo. *Dab. Gissa Hessorum, die 20. April. A. 1715.*

MICHAEL BERNHARDUS VALENTINI,

Archiatr & P. P. Gissæ.

INSTI.







Separatorium
Cles ab aqua



Concha



Pinta

Cucurbita



Cucurbita
Circulatoria



Serpentina pro rectif



Retorta cum excipulo



Infundibulum



Circuli








Flos Campaniformis



Flos Campanulobulatus



Flos Hypocrateriformis



Flos Infundibuliformis



Flos Rosaceus



Flos Cruciformis



Flos Caryophyllæus



Flos Rosaceus



FLORES APETALAE STAMINEAE

Flos Avenæ



Flos Sparganiæ



Flos Equisetæ



*Flos Campaniformis
globosus.*



Flos Lilaceus.




*Flos Bellidone
Campaniformis
multiflorus.*



FLORES COMPOSITI.

Flos Racematus.



Flos floscularis.



Flos semiflosculosus.



FLORES ANOMALI.

Flores Polypetali anomali.



Fl. Papilionaceus.



Flos Personatus.



Flores Monopetali anomali.



Flos Labratus.





EX

HEE
confic





T

practically
the 1st
Mar.
the
Apr.
O.
the
the
the

1994
1995
1996
1997
1998
1999

[illegible]

1992

9528

九一

1999



INSTITUTIONUM BOTANICARUM

CLASSIS I.

DE

HERBIS FLORE MONOPETALO CAMPANIFORMI.

SECTIO

1.

Cujus Pistillum abit in fructum mollem & crassiusculum.

{ *Mandragora.*
Belladonna.

2.

Pistillum abit in fructum mollem & exiguum.

{ *Lilium convallium* { flore albo.
Polygonatum. { flore rubro.
Ruscus.

3.

Pistillum abit in fructum siccum, seu testam unicapularem in nonnullis, in aliis in multicapularem.

{ *Cerinth.*
Gentiana { Major { cruciata.
Hydrophyllum. { Minor { gentianella.
Soldanella.
Carvolvulus.
Thymalus.
Glaux.

4.

Cujus Pistillum abit in unicum semen.

{ *Oxy.* seu *Tritol.* acetos.
Rhabarbarum f. *Rhaponticum.*

5.

Pistillum abit in fructum ex vaginalis aut folliculis constantem.

{ *Corydalis.*
Apocynum.
Pteropoda.
Aclepias.

6.

Ex cupis subrotundis exurgit pistillum excipiens, quod in fructum multicapularem abit.

{ *Malva* { vulgar.
Althea. { crisp.
Alcea. { rosea.
Malacoides.
Abusylon { *Alcea Vesicaria.*
Kermia { *Abelmosch.*
Xylon.

7.

Cujus calyx abit in fructum plicatumque carnosum.

{ *Bryonia* { Vit. alb.
Tamnus. { *Momordica Ind.* scand. f. fort.
Sicoides.
Momordica { sativ.
Cucumis { *Asinus* sylvestris.
Pepo.
Melopepo.
Anguria.
Cucurbita.
Colocynthis.

8.

Cujus calyx abit in fructum siccum.

{ *Campanula* { *Cervicaria.*
Rapunculus. { *Rapunc.* { Hort.
{ *Speculum Veneris.* { Sylv.

9.

Cujus calyx abit in fructum gemellum.

{ *Rubia.*
Apparint.
Gallium.
Cruccaria.

Herbae Flore Monopetalo Campaniformi.

CLASSIS II.

DE

HERBIS FLORE MONOPETALO INFUNDIBULIFORMI ET ROTATO.

SECTIO

1. Gaudens Flore infundibuliformi, cujus pistillum abit in fructum

Quamoclit. { Trifol. pal. majus.
Menyanthes { - - fibrinum.
Nicotiana.
Hyoscyamus { vulgar.
 { albus { major.
Stramonium.
Pervinca.
Amsicula Urf.
Centaurium minus.

2. Cujus Flos Hypocrateriformis, quoad pistillum abit in fructum

Androsace.
Primula Veris.
Plantago { latifolia.
 { rofca.
 { angustifolia.
Coronopus.
Pfyllium.

3. Cujus Flos infundibuliformis, quoad calycem, abit in fructum

Jalapa, seu Solanum Mexican.
Rubra.
Trachelium { Cervicaria Valerian.
 { Pyramidalis.
Valeriana.
Valerianella.

4. Cujus Flos infundibulif. vel rotatus pistillum elit 4. veluti embryonibus stipatum, in totidem semina abeuntibus & in calice maturefcentibus

Borrag { flore { caeruleo.
 { candido.
Duglossium { Cynoglossum minus.
 { Anchusa { major.
 { Echiodides { minor.
Asterugo.
Echium.
Pulmonaria.
Lichospermum.
Symphitum { majus } tuberos. rad.
 { minus }
Heliotropium.
Cynoglossum.
Omphalodes.

5. Flore infundibulif. & sem. singular.

{ *Plumbago*.

6. Fl. rotato, cujus pistillum abit in fructum secum

Lysimachia { Nummularia { major.
 { Ephemeron Spur. Lob. { minor.
Samolus, seu Anagallis aquatica.
Veronica { Pseudo-Chamadrin.
 { Lysimachia Spicata.
Chrysosplenium.
Polemonium, seu Valeriana Graca.
Verbascum.
Blattaria.

7. Fl. rotato, cujus pistillum abit in fructum mollem

Solanum.
Lycopersicon, seu Poma amoris.
Alkekengi.
Meloenia.
Cappicum.
Nymphaeides.
Cyclamen.
Alopharellina.

8. Cujus calyx abit in fructum

{ *Pimpinella* { Major.
 { Minor { Lrvie.
 { hirsuta.
 { inodora.

Herbæ Flore Monopetalo infundibuliformi & rotato.

CLASSIS III.

DE

HERBIS ET SUFFRUTICIBUS FLORE MONOPETALO ANOMALO.

Seff. 1.

Aurito vel cucullato.

Arum { non maculatum.
 { maculat. mac. { candid.
Dracunculus. { nigris.
Arisarum { latifolium.
 { triphyllum.

2.

Tubulato in linguam deficiente.

Aristolochia { rotunda.
 { longa { vera.
Raponticum. { Hisp.
 { pistol.

3.

Utrinque patente.

Sigonia.
Digialis { Purpur.
 { Fl. candid.
 { Minim. Gratiola dicta.
 { Minor angustif.
Pinguicula.
Scrophularia.

Herbæ Flore Mono-
petalo, Ano-
malo, in

4.

Tubulato personato.

Antirrhinum { Vulg. maj.
 { Arvense.
Linaria.
Asarina.
Pedicularis { Purpur. vulg.
 { Lat. f. Crilla Gall.
Melampyrum.
Euphrasia { Officin.
 { Min.
Polygala.
Albivoda.
Orobanch.

5.

In annulum deficiente.

Acanthus { Sativas seu Branca urf.
 { Sylvest.

CLASSIS IV.

DE

HERBIS ET SUFFRUTICIBUS FLORE MONOPETALO LABIATO.

SECTIONE

1.
Habent labium superius galeatum vel
falcatum.

{ *Phlomis.*
Hermannium.
Sclarea.
Salvia { *Latifolia.*
 { *Tenuifolia.*
 { *Fol. variegat. l. picta.*
Dracocephalon.
Cassida.
Brennha.

2.
Habent labium superius cochlearis in-
star excavatum.

{ *Lamium* { *album vulg.*
 { *purpureum.*
Moldavica seu *Melisa Turca.*
Baltea.
Galeopsis { *Lamium maximum Sylv.*
 { *Urtica aculeata.*
 { *Sideritis arvensis.*
Stachys.
Cardiaca.
Leonurus.
Melissa.
Pseudodillamnium.
Menha, quo pertinet { *Calamintha arv.*
Marrubiastrum. { *Pulegium.*
Lycopus.

Herbæ Flore Mono-
petalo Labia-
to, in

3.
Habent labium superius erectum.

{ *Sydeiris.*
Marrubium.
Melisa.
Calamintha { *Vulg. officin.*
 { *Pulegium Sylv.*
 { *Holera terrestres.*
Clinopodium.
Rosmarinus.
Thymus, quo pertinet { *Thymus vulg.*
Serpillum. { *Serpentar. Virginic.*
Satureja.
Thymus.
Lavandula.
Origanum, quod l. { *Vulgar. & Sylv. vel*
 { *Creticum seu Di-*
 { *laminum Cret.*
Marjanna.
Verbena.
Hyssopus.
Scutellaria.
Catappa.
Betonica.
Ocimum.

4.
Gaudent flore monopetalo unilabiato.

{ *Chamaedris*, quæ ref. { *Scordium.*
 { *Salvia Sylv.*
Palin.
Tenacium.
Chamaepitys.
Bugula.

CLASSIS V.

DE

HERBIS FLORE POLYPETALO CRUCIFORMI.

1. Est, cujus pistillum abie in fructum unicapularem non sitiquosum
2. Cujus pistillum abie in fructum satis brevem, bifariam divisum, septo intermedio, respectu valvarum, ad perpendicularum oblique positum.
3. Cujus pistillum abie in fructum septo intermedio valvis parallelis, bifariam divisum.
4. Cujus pistillum abie in fructum sitiquosum, bicapularem.
5. Cujus pistillum abie in siliquam articulatam.
6. Cujus pistillum abie in siliquam unicapularem.
7. Cujus pistillum abie in fructum in terna aut quaterna loculamenta divisum.
8. Cujus pistillum abie in pterima semina in capitulum collecta.
9. Cujus pistillum abie in fructum mollem.
- Thlaspi.*
Rapistrum.
Myagrum.
Isatis.
Crambe.
- Thlaspi*, quo
- Nasturtium.*
Thlaspidium.
Cochlearia { *Lepid. glastif.*
 { *Raph. Rustic.*
Lepidium.
Bursa Past.
- Alyssum.*
Alyssoides.
Linaria.
- Brassica* { *vulgaris.*
 { *capitata.*
 { *Sabauda.*
 { *caulorapa.*
 { *asperagod.*
 { *cauliflor.*
- Lanceolum.*
Hesperis.
Turritis.
Cardamine { *Nisurt. prat.*
 { *Nasl. aquat.*
Dentaria.
Sisymbrium { *Raphan. aquat.*
 { *Sophia Med.*
Fruca.
Sinapi.
Erysimum.
Rapa.
Napus.
Raphanus.
- Raphanistrum.*
Hypecum.
- Chelidonium.*
Sinapisstrum.
Epimedium.
- Erucage.*
- Poranogeton* { *Tribulus aquat. minor*
 { *Millefol. aquat.*
- Herba Paris.*

Herbæ Flore Polypetalo Cruciformi gaudentes IX. habent Sectiones, quarum

CLASSIS VI.

DE

HERBIS FLORE ROSACEO.

Herbæ Flore Rosaceo IX. Genera habent, quorum

1.
Est, cujus pistillum abit in fructum uncapitularem, bifurcam transverse hinc inde.
 { *Amaranthus.*
 { *Portulaca.*
2.
Cujus pistillum aut calyx abeunt in fructum uncapitularem.
 { *Papaver.*
 { *Argemone.*
 { *Anagallis.*
 { *Oxalis.*
 { *Gravilla.*
 { *Adonis.*
 { *Alina.*
 { *Alinastrum.*
 { *Myosotis.*
 { *Ros. Salis.*
 { *Paeonia.*
 { *Juncea.*
 { *Kali.*
 { *Telephium.*
 { *Holcus.*
 { *Andros.*
3.
Cujus pistillum abit in fructum plerumque bicapitularem.
 { *Centa.*
 { *Saxifraga.*
 { *Salicaria.*
 { *Glaucum seu Papav. Coronid.*
4.
Cujus pistillum abit in fructum multicapitularem.
 { *Hypericum.*
 { *Ajrum.*
 { *Syn.*
 { *Danthonia.*
 { *Ruta.*
 { *Formica.*
 { *Ngela.*
 { *Pabaga.*
 { *Coriaria.*
 { *Cyssa.*
 { *Nymphaea.*
5.
Cujus pistillum abit in fructum, in quo veluti indolentur semina.
 { *Nelumbo.*
 { *Cappari.*
6.
Cujus pistillum abit in fructum ex pluribus veluti capitulis compositum.
 { *Sedum.*
 { *Azaxampifera.*
 { *Ulmaria.*
 { *Burba Capra.*
 { *Fagelia.*
 { *Juncea.*
 { *Crucium.*
 { *Talium.*
 { *Haltum.*
 { *Hilberum.* sub quo Aconit. min.
 { *Vernum.*
 { *Papalaga.*
 { *Pentia.*
 { *Trubini.*
7.
Cujus pistillum abit in fructum ex pluribus seminibus in capitulum quoddam collectum compositum.
 { *Anemone.*
 { *Pulsilla.*
 { *Ranunculus.*
 { *Filipendula.*
 { *Centaurea.*
 { *Caryophyllata.*
 { *Tragaria.*
 { *Pentastylis.*
 { *Armenia.*
 { *Pentastylis.*
8.
Cujus pistillum vel calyx abit in fructum mollem.
 { *Chrysanthemum.*
 { *Physalis.*
 { *Aralia.*
 { *Asparagus.*
9.
Cujus calyx abit in fructum succum.
 { *Cambesilla.*
 { *Cocca.*
 { *Agrimonia.*
 { *Agrimonia.*
 { *Onagra.*
 { *Chrysanthemum.*

CLASSIS VII.

DE

HERBIS FLORE POLYPETALO ROSACEO UMBELLATO.

1.
Circinató dispositó, cujus calyx abít
in duo femina exigua & striata.
 - Asmi.*
 - Apium* { *Petroelin.* } *Vulg.*
 - Cicuta.* { *Anisum.* } *Maced.*
 - Carvi.*
 - Phellandrium.*
 - Bulbocastaneum.*
 - Daucus* { *fativus* } *Passinaca tenuis.*
 - Sium.* { *sylvestris*
 - Sisarum.*
 - Tragofelinum.*
 - Bupleurum.*
2.
Circinató dispositó, cujus calyx in 2.
femina angusta, oblonga & satis cras-
sa abít.
 - Feniculum* { *Comin. fativ.*
 - Menn.* { *Scicli Massil*
 - Oenanthe.*
 - Angelica.*
 - Astrantia.*
 - Cheraphyllum.*
 - Athyris.*
3.
Circinató dispositó, cujus calyx in 2.
femina subrotunda & crassiora abít.
 - Smirnum.*
 - Coriandrum.*
4.
Circinató dispositó, cujus calyx abít
in 2. femina plana, ovata, satis am-
pla.
 - Imperatoria.*
 - Cruhum.*
 - Anethum.*
 - Pucedanum.*
5.
Circinató dispositó, cujus calyx abít
in 2. femina ovata, plana, ampla.
 - Oreoselinum.*
 - Thyselinum.*
 - Passinaca Latifolia* { *Sativ.*
 - Sphenodyllum.* { *Sylv.*
 - Tordylium* { *ma.*
 - Fernla.* { *min. L. Scicli Cret.*
 - Thapsia.*
6.
Circinató dispositó, cujus calyx abít
in 2. femina ampla & profundis striis
excavata.
 - Cicutaria.*
 - Caucalis.*
 - Ligusticum.*
 - Laserpitum.*
7.
Circinató dispositó, cujus calyx abít
in 2. femina cortice fungoso ob-
ducta.
 - Cachrys.*
8.
Circinató dispositó, cujus calyx abít
in 2. femina in caudam longam de-
sinentia.
 - Scandix.*
9.
Flore umbellato, in capitulum conglo-
bato.
 - Sanicula.*
 - Eryngium.*
 - Hydrocotyle.*

Herbæ Flore Mono-
petalo Rosaceo
umbellato

CLASSIS VIII.
DE
HERBIS FLORE POLYPETALO CARYO-
PHYLLÆO.

Herbæ Flore Poly-
petalo Caryo-
phyllæo, cujus

1.
Pistillum abit in fructum.

- Caryophyllus* {
 - simplicis { hortensis. { maj.
 - { sylvestr. { muralis.
 - plenus { maximus.
 - { Carthusianorum.
- Lychnis* { coronaria.
- { viscosa.
- { sylvestris { Saponaria.
- { illos cuculi.
- Cucubalus* vel *Alfinc* baccifera.
- { lativum, vulg. cæruleum.
- { perenne { majus.
- { minus.
- { arvense.
- Linum* { sylvestre.
- { maritimum.
- { pratense.
- { Lusitanicum.
- { Alpinum.

2.
Pistillum abit in semen calyce ipso in-
volutum.

- Stachys* {
 - Caryophyll. mont. { major.
 - { minor.
 - { minimus.
 - Caryophyllus Alpinus.
 - Lusitania { Scorzon. fol.
 - { fruticosa.
 - { capillar. fol.
- Limonium* {
 - Maritimum { Majus.
 - { Minus.
 - { Minimum.
 - Fruticosum.
 - Reticulatum.
 - Siculum.
 - Lusitanicum.
 - Hispanicum.
 - Valentinum.

CLASSIS IX.

DE

HERBIS FLORE LILIACEO.

Herbæ Flore Liliaceo

1.
Monopetalo, in sex partes secto, cujus pistillum abit in fructum.

Asphodelus.
Lilium - Asphodelus.
Hyacinthus.
Muscari, quo ref. *Hyacinth.* { *Racemosus.*
Colchicum. { *Comosus.*

2.
Monopetalo, in sex partes secto, cujus calyx abit in fructum.

Crocus { *autumnalis*
 { *vernus.*
Narcissus.
Iris, quæ vel { *hortensis.*
 { *styl.* { *pratensis.*
 { *palustris.*
Xiphium.
Sisyrinchium.
Gladiolus.
Aloe.
Cannacorus { *Canna Indica.*
 { *Curcuma.*

3.
Tripetalo.

{ *Ephemerum*, i. *Phalangium Virginianum.*

4.
Hexapetalo, cujus pistillum abit in fructum.

Phalangium.
Liliastrum.
Lilium.
Lilium - Hyacinthus, i. *Hyac.* *bellus fol.*
Corona Imperialis. { *rad. lil.*
Tulipa.
Fritillaria.
Dens Canis.
Ornithogalum.
Potrum.
Cepa, quod pertinet { *stiva* { *vulgaris.*
 { *foetida.*
Allium. { *juncifol.* { *Callium styl.*

5.
Ex petalis sex composito, cujus calyx abit in fructum.

{ *Lilio - Narcissus.*
 { *Narcisso - Lancium.*
Bernardiniana, quæ vel { *iridis* } *fol.*
 { *palma* } *palma*

CLASSIS X.

DE

HERBIS FLORE POLYPETALO; PAPI- LIONACEO.

Herbæ Flore Poly-
petalo, Papilio-
naceo, cujus

| | |
|---|---|
| 1. Pistillum abit in siliquam unicap- sularem & brevem. | <ul style="list-style-type: none"> <i>Glycyrrhiza.</i> <i>Cicer.</i> <i>Lens.</i> <i>Onobrychis.</i> <i>Vulgararia.</i> <i>Dorycnium.</i> |
| 2. Pistillum abit in siliquam unicap- sularem longam. | <ul style="list-style-type: none"> <i>Faba</i>, quæ vel <ul style="list-style-type: none"> major. minor. minima. <i>Lupinus.</i> <i>Orobus.</i> <i>Pisum</i> <ul style="list-style-type: none"> major quadratum. minus <ul style="list-style-type: none"> hortense. arvense fruct. <ul style="list-style-type: none"> albo. coeruleo. virido. <i>Lathyrus.</i> <i>Clymenum.</i> <i>Ochrus.</i> <i>Vicia.</i> <i>Ervum.</i> <i>Galega</i>, quæ vel <ul style="list-style-type: none"> Vulgaris. Africana. Americana. <i>Astragaloides.</i> <i>Aphaca.</i> |
| 3. Pistillum abit in siliquam articulatam. | <ul style="list-style-type: none"> <i>Securidaca.</i> <i>Ornithopodium.</i> <i>Ferrum equinam.</i> <i>Hedysarum.</i> <i>Scorpioides</i>, siliquis vel <ul style="list-style-type: none"> plenibus. asperis. |
| 4. Folius ternis. | <ul style="list-style-type: none"> <i>Lotus.</i> <i>Trifolium.</i> <i>Melilotus</i>, quod ref. <i>Trifolium prat. luteum.</i> <i>Anenis.</i> <i>Fanumgracum.</i> <i>Medeca.</i> <i>Medicago.</i> <i>Phaseolus</i> <ul style="list-style-type: none"> Vulgaris. Americanus. Brasilianus. Aegyptiacus. |
| 5. Pistillum abit in siliquam bicap- sularem. | <ul style="list-style-type: none"> <i>Astragalus.</i> <i>Tragacantha.</i> <i>Pelecynus.</i> |

CLASSIS XI.

DE

HERBIS FLORE POLYPETALO ANOMALO

Herbæ Flore Polypetalo Anomalo, cujus

| | |
|--|--|
| <p>1. Pistillum abit in fructum unicapsularem.</p> | <p><i>Balsamina</i> { <i>Fœmina</i>, <i>Indica</i>. <i>Noli me tangere</i>. <i>Viola</i> { <i>Martia</i>. <i>Flos Trinitatis</i>. <i>Fumaria</i>, quod ref. { <i>Fum. Officin.</i> <i>Radix cava</i>. <i>Capnoides</i>. <i>Reseda</i>. <i>Luteola</i> { <i>Salicis folio</i>. <i>Lusitamica</i>. <i>Pyrenaica</i>.</p> |
| <p>2. Pistillum abit in fructum multicapsularem.</p> | <p><i>Sesamoides</i>. <i>Aconitum</i>, sub quo { <i>Napellus</i>. <i>Anathora</i>. <i>Delphinium</i>, ad quod pertinet. { <i>Consol. Reg.</i> <i>Staphisagr.</i> <i>Aquilegia</i>. <i>Fraxinella</i>. <i>Cerdaminum</i>, l. <i>Nast. Indicum</i>. <i>Melancholus</i>. <i>Carindum</i>.</p> |
| <p>3. Calyx abit in fructum.</p> | <p><i>Orchis</i> { <i>Cynosorchis</i>. <i>Palma Christi</i>. <i>Hebeverina</i>. <i>Calceolus</i>. <i>Lamodorum</i>. <i>Ophris</i> { <i>bifolia</i>. <i>bulbos.</i> <i>trifolia</i>. <i>palustris</i>. <i>minima</i>. <i>Nidas avis</i>, l. <i>Orobanchio</i>.</p> |

CLASSIS XII.

DE

HERBIS FLORE FLOSCULOZO.

Herbæ Flore Flo- sculozo

| | |
|--|---|
| 1. Sterili. | <ul style="list-style-type: none"> <i>Xanthium</i> { Diof. f. <i>Lappa minor.</i> { <i>Canadense.</i> { <i>Lusitanicum.</i> <i>Ambrosia.</i> <i>Gnaphalodes.</i> |
| 2. Semine pappi instructo. | <ul style="list-style-type: none"> <i>Carduus</i>, quò ref. { <i>Jacea lutea.</i> <i>Cynara.</i> { <i>Card. Maris.</i> <i>Jacea.</i> <i>Cyanus.</i> <i>Cirsium.</i> <i>Centaureum majus.</i> { <i>Major.</i> <i>Lappa</i>, cujus species <i>Lappa</i> { <i>Maxima.</i> <i>Cnicus.</i> { <i>Montan.</i> <i>Pteris</i> { <i>Major f. vulgaris.</i> { <i>Minor.</i> <i>Cacalia.</i> <i>Elychrysium.</i> <i>Filago.</i> <i>Coryza.</i> <i>Eupatorium.</i> <i>Senecio</i> { <i>Vulgaris.</i> { <i>Americanus.</i> |
| 3. Semine pappi nequaquam instructo. | <ul style="list-style-type: none"> <i>Carthamus.</i> <i>Absinthium</i> { <i>Vulgare.</i> { <i>Ponicum.</i> <i>Abrutannum.</i> <i>Arenaria.</i> <i>Santolina.</i> <i>Gnaphalium.</i> <i>Tanacetum</i> { <i>vulg. luteum.</i> { <i>crispum.</i> (fera. { <i>hortens. seu mentha corymbi-</i> |
| 4. Flosculis in lacinias æquales divisis & calyci proprio insidentibus. | <ul style="list-style-type: none"> <i>Echinops.</i> |
| 5. Flosculis in lacinias inæquales ut plurimum divisis & calyci proprio insidentibus. | <ul style="list-style-type: none"> <i>Scabiosa.</i> <i>Dipsacus</i> { <i>fativus.</i> { <i>sylvestris.</i> { <i>folio laciniato.</i> { <i>Giganteus.</i> { <i>Indicus.</i> <i>Globularia.</i> |

CLASSIS XIII.

DE

HERBIS FLORE SEMI-FLOSCULOSO

t.
Semine Pappis instructio.

Deni Lesmiz.

Hieracium, quò { Pulmonaria Gallic.
 { Auric. maris Hesper.

Lactuca { vulg.
insybacea.
crispa.
sylvestr.

Search.

Chandrika.

Zacineba, f. *Chondrilla* *Verrucaria*.

Scaphandra.

Trigonotis { *pratensis* { *majus.*
 { *porri folio.* { *minus.*
 { *hirsuta*

Herbæ Flore Semi-Flosculofo

4.
Semine nullis Pappis instructo.

Catananche flocc. { plen. cærul.
 { dur. { latifol.
 { { angustif.

McAynnis.

| | | |
|-----------|-------------------|---------------------------|
| | faticum | { latifol. angustifol. |
| Cichorium | sylvest. officin. | |

Lampson,

Respiration

Scylomyas { *Chrysaethemus* *anthrus*,
 { *Chrysaeth.* *African.*

CLASSIS XIV.
DE
HERBIS FLORE RADIATO.

Herbæ Flore Ra-
diato.

| | |
|---|---|
| 1. Semine Pappis instructis | <i>Aster</i> { <i>Atticus</i> { <i>vulgaris.</i> { <i>arvensis.</i> { <i>Alpina.</i> <i>Verga aurea.</i> <i>Jacoba</i> { <i>vulg.</i> { <i>Alpina.</i> { <i>Hispanica.</i> <i>Tussilago.</i> <i>Doronicum.</i> |
| 2. Seminibus capitulo foliato instructis. | <i>Targues</i> seu <i>Flos Africanus</i> { <i>Major.</i> <i>Corona Solis.</i> { <i>Minor.</i> |
| 3. Semine Pappis & Capitulis foliosis ca- rentis. | <i>Bellis</i> { <i>horrens.</i> { <i>subra.</i> { <i>lylv.</i> { <i>varieg.</i> { <i>alba.</i> { <i>prolifera.</i> <i>Chrysanthemum.</i> <i>Leucanthemum</i> { <i>Bellis major.</i> { <i>montan.</i> <i>Matricaria.</i> <i>Chamamelum</i> { <i>Vulgare.</i> { <i>Romanum.</i> <i>Cotula.</i> <i>Euphrasium.</i> <i>Millefolium.</i> <i>Præmna</i> { <i>Vulgar. Præmna.</i> { <i>Alpina.</i> <i>Asteriscus.</i> |
| 4. Seminibus in capsula reconditis. | <i>Calcha</i> { <i>vulgaris.</i> { <i>Polyanthos.</i> |
| 5. Cujus discus ex petalis planis compo- nitur. | <i>Xeranthemum.</i> <i>Carlina</i> { <i>Acaulos.</i> { <i>Cauliscentes.</i> { <i>Sylvestris.</i> |

CLASSIS XV.

DE

HERBIS FLORE APETALO f. STAMINEO.

1.
Cujus calycis posterior pars abit in fructum.

Asarum { Dodon.
Americanum.
Virginianum.
Beta { alba. { major.
 { rubra { minor.

Acerosa.
Lapathum.
Arriplex, quæ vel { hortensis { alba;
 { sylvestris. { rubra.
Chenopodium, ad quod pert. { Botrys.
 { Bonus Hemo.

2.
Cujus pistillum abit in semen calyce involutum.

Blitum.
Herniaria. { Narbonensis. { Supina.
Paronychia { Hispanica { fruticosa.
Alchimilla. { Lusitanica.
Parietaria.
Perficaria { mitis { maculosa.
 { urens f. Hydrcopiper.
Polygonum.
Fagopyrum.
Biflora { Vulg. major & med.
 { Alpina { maxima.
 { media.
 { minor.

Herbæ Flore Apetalo f. Stamineo

3.
Apetalo, quæ Cereales appellantur, earumque affines.

Triticum.
Secale { vernum, vel minus C. B.
 { hybernum, vel majus C. B.
Herdium.
Oryza.
Avena { alba, seu vulgaris.
 { nigra tenuior.
Milium. { Lolium.
Panicum. { Spicatum.
Gramen. { Dactylon.
Arundo. { Paniculatum.
 { Avenaceum.

4.
Apetalo in capitulum squamosum collecto.

Cyperus { Rotundus, vulg. C. B.
 { Americanus.
Scirpus { Orientalis.

5.
Apetalo in eadem planta à floribus separato.

Cyperoides. { major.
Typha palustris { media.
Sparganium. { minor.
Maya.
Lacryma Johi. { Vulgaris.
Ricinus, qui vel { American.
 { African.
 { Zeylanicus.

6.
Apetal. quarum aliz in eodem genere floribus, aliz verò fructibus plerumque donantur.

Equisetum.
Spinacia.
Morcenialis { vesiculata f. mas.
 { spicata f. femin.
Urtica.
Cannabis.
Lupulus { Mas.
 { Femin.

CLASSIS XVII.

DE

HERBIS QUARUM FLORES ET FRUCTUS
vulgò DESIDERANTUR.

1.
Herbæ terrestres floribus & fructibus
vulgò desistant

- Muscus* { capillaceus.
squamosus.
pennatus.
Fungus.
Fungoides, quo pertinent { Fungi Seminiferi
Pezizæ.
Boletus.
Agaricus { Officin. è Larice.
Pedis equini facie.
Auricul. formæ f. Aur. Jud.
Lycoperdon { maximum, d. Chr. Porista.
medium.
pulverulentum.
Coralloides.
Tubera. { Matth.
Testiculorum formæ.

Herbæ, quarum
Flores & Fructus
vulgò desiderantur, sunt

2.
Herbæ Marinx aut fluviales floribus
& fructibus vulgò carentes.

- Fucus.*
Alga { angustifolia Vitriariorum.
graminea { minor.
fluvialis. { seminifera.
capillacea.
Acetabulum.
Coralina { fistulosa.
geniculata.
mascosa &c.
album.
Coralium { flavum.
rubrum { intens.
ros. col.
Madrepora.
Lithophyton { Corallium nigrum f. antip.
frutic. marin.
Tubularia.
compressa { magna
{ exig. forma.
Spongia { globosa.
ramosa.
villosa.
Americana.
Eschara.
durum.
molle.
Alcyonium { stuposum.
tuberosum.
vermiculatum.

CLASSIS XVIII.
DE
ARBORIBUS ET FRUTICIBUS FLORE
APE TALO.

Arbores & Fru-
tices Flore Ape-
talo

1.
Cum fructu conjuncto.

Fraxinus { Excelsior.
 { latifolia.
 { rotundior fol.
 { florifera.
Siligna { non edulis.
 { edulis { communis.
 { fructu breviori.
 { fructu vario.

2.
In eadem plurā à fructu separato.

Buxus { maxim. arborese
 { major.
 { minor.
 { fol. { longior.
 { rotund.
Empetrum { Montanum.
 { Lulianicum.

3.
Quorum alia in eodem genere flori-
bus, alii verò fructibus plerumque
donantur.

Tersibintus { Vulgaris.
 { Peregrin. fruct. { maj.
 { min.
 { Indica.
 { Pistacia Trifol.
 { Cappadocica.
 { Americana.
Lentiscus { Vulgaris.
 { Angustifol.

CLASSIS XIX.

DE

ARBORIBUS ET FRUTICIBUS FLORE AMENTACEO.

Arbores & Fruti-
ces Flore Amenti-
taceo

1. In eadem arbore a fructu offeo sepa-
rato.
 - Nux* {
 - Vulgaris seu Regia.
 - caballina fr. max.
 - fragilis.
 - bifera &c.
 - fructu pedunculato.
 - Corylus*.
 - Carpinus*.
2. In eadem arbore plerumque separato
à fructu, ejus involucrium eoria-
ceum est.
 - Quercus* {
 - Vulg. pedic. { brevis.
 - { longo.
 - Burgundica.
 - parva { Phagus Græcor.
 - { Pumila Clus.
 - Ilex*.
 - Saber*.
 - Fagus*.
 - Castanea* {
 - fativa, major.
 - sylvestris.
 - humilis.
 - Americana.
 - 3. In eadem arbore separato à fructu
squamoso.
 - Abies*.
 - Pinus*.
 - Laryx*. {
 - Conifera fol. decid.
 - Oriental. f. Cedrus Liban.
 - Americana.
 - Thuja*.
 - Cupressus* {
 - Plinii {
 - Maf.
 - Fœminis.
 - Lusitana.
 - Alnus*.
 - Betula*.
 - 4. In eadem arbore separato à fructu
mollis.
 - Cedrus* {
 - folio cupress. { maj.
 - { mod.
 - Hispanica.
 - Juniperus*.
 - Taxus*.
 - Abies* fruct. {
 - nigro.
 - albo.
 - 5. In eadem arbore separato à fructu
siccus.
 - Platanus* {
 - Orientalis.
 - Occidentalis.
 - 6. Quorum alii in eodem genere florum
tantum, alii verò fructibus solis
plerumque donantur.
 - Salix*.
 - Populus* {
 - alba {
 - maj. fol.
 - min. fol.
 - nigra.
 - treminula.

CLASSIS XX.

DE

ARBORIBUS ET FRUTICIBUS FLORI MONOPETALO.

Arbores & Frutices
Flore Mono-
petalo, cujus

- | | | |
|----|---|---|
| 1. | Pistillum abie in fructum mollem seminibus callosis factum. | <ul style="list-style-type: none"> <i>Rhamnus</i> { <i>Cathartica</i>. <i>Thymelea</i>. <i>Alaternus</i>. <i>Phytolacca</i>. <i>Ligustrum</i> { <i>Chamaecrista</i>. <i>Laurus</i>. <i>Jasminum</i>. <i>Arbutus</i> { <i>Indica</i> <i>terrestris</i>. |
| 2. | Pistillum abie in fructum lamiibus ossis factum. | <ul style="list-style-type: none"> <i>Olea</i>. <i>Syrax</i>. <i>Uva Ursi</i>. <i>Aquilegium</i>. <i>Guzjacana</i> { <i>Angustifolia</i>. |
| 3. | Pistillum abie in fructum membranaceum. | <ul style="list-style-type: none"> <i>Ulmus</i> { <i>campestris</i>. <i>folio</i> { <i>lanceolato</i>. <i>glabro</i>. |
| 4. | Pistillum abie in fructum multicapsularem. | <ul style="list-style-type: none"> <i>Lilac</i> { <i>Ligust. fol. carnea</i>. <i>Syringa fl. caerulea</i>. <i>fol. laciniat.</i> <i>Erica</i>. <i>Virex</i> f. <i>Agnus castus</i> { <i>multifol.</i> <i>Chamaerhodendron</i> { <i>angust.</i> |
| 5. | Pistillum abie in fructum siliquosum. | <ul style="list-style-type: none"> <i>Nerium</i> { <i>flor.</i> { <i>rubesc.</i> <i>Imbricatum</i> { <i>alba</i>. <i>Alnus</i>. <i>Amelanchier</i>. |
| 6. | Calyx abie in baccam. | <ul style="list-style-type: none"> <i>Sambucus</i> { <i>virgata</i>. <i>racemosa rubra</i>. <i>herbacea</i> f. <i>Ebulus</i>. <i>Opulus</i> f. <i>Samb.</i> { <i>aquat.</i> <i>rosea</i>. <i>Viburnum</i>. <i>Tinus</i>. <i>Vitis idae</i> f. <i>myrtilli</i> { <i>nigr.</i> <i>Caprifolium</i> { <i>rubr.</i> <i>Periclymenon</i>. <i>Chamaetrasus</i>. <i>Xylajtem</i>. |
| 7. | Flore monopetalo à fructu separato. | <ul style="list-style-type: none"> <i>Viscum</i> { <i>baccis</i> { <i>alb.</i> <i>rubr.</i> |

CLASSIS XXI.

DE

ARBORIBUS ET FRUTICIBUS FLORE
ROSACEO.Arbores & Fruti-
ces Flore Rosa-
ceo, cujus

| | |
|--|---|
| 1. Pistillum abit in fructum unicap- sularem. | { Cotinus. Taxicodendron. Rhus. Tilia folio {maj. L. ul. vulgar. {min. {molliciter hirsut. Hippocastanum. |
| 2. Pistillum abit in baccam, vel singula- rem, vel multiplicem. | { Celtis. Frangula. Hedera {Communis. {Poetica. {Americana. Vitis. Berberis. Rubus {vulg. {idzus fr. {alb. {rubr. |
| 3. Pistillum abit in fructum multicapsu- larem. | { Acer. Staphylo-dendron {vulgar. {trifolium. Palurus. Azedarach. Eunymus. Syringa alba {flor. simpl. {flor. plen. |
| 4. Pistillum abit in fructum ex siliculis in caputulum congestis compositum. | { Spiraea. |
| 5. Pistillum abit in siliquam. | { Senna {Alexandrina acut. fol. {Florentina obtus. {Americana. Ponciana. Cassia. |
| 6. Pistillum abit in fructum carnosum, seminibus callosis factum. | { {vulg. {dole. } med. {acer. } Anacardium {sylvell. Citrenum. {frutiferum. {simpl. Limon. {Sincense. {multipl. |
| 7. Pistillum abit in fructum officulo fac- tum. | { Prunus. {majori. Armeniaca fruct. {medio. Persea. {minor. Cerasus. {sativ. {dole. } dur. {amar. } frag. Amygdalus {Indica varia. Zitheni. Laurus-Cerasus. |
| 8. Calyx abit in fructum seminibus cal- losis factum. | { Prunus. Cudania fructu {oblong. Crataegus. {rotund. Sorbis. Malus. Punica Boc. {simpl. Rosa. {pleno f. Behav. Grossularia. Myrica. |
| 9. Calyx abit in fructum ossiculis factum. | { Cornus {hortensis. {sylvell. Mespilus. |

CLASSIS XXII
DE
ARBORIBUS ET FRUTICIBUS FLORE
PAPILIONACEO.

Arbores & Frutices Flore Papilionaceogaudent vel

| | |
|---|--|
| 1. Foliis singularibus, alternò aut verticillato ordine dispositis, ut | <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-right: 10px;">{</div> <div> <i>Crotalar.</i> { Asiatica { folio serruc. { Africana. { fol. cordiform. { Americana. { Indix Orient. </div> </div> <div style="margin-right: 10px;">{</div> <div> <i>Genista.</i> <i>Spartium.</i> <i>Genista-Spartium.</i> { Cretica. <i>Erinacea</i> { Hispanica. <i>Genistella.</i> <i>Siliquastrum</i> { Judaic. arb. { flore albo. { amphoribus foliq. { Canadense. </div> |
|---|--|

D. PAULI HERMANNI

CHARACTERISMI
MATERIÆ MEDICÆ.CLASSIS I
DE PARTIBUS ANIMALIUM.

| | | | |
|---------------------------------|--|--------------------------------|--|
| Animalium partes sunt vel | { Saline } | cum multis terreis particulis. | { Cornu Cervi. Cranium humanum. Ebor. Unicorru. Ungula Alcis. Blasta Byzantina. Oculus 69. Mandibula Luc. piscis. Dentes Apri. Os Sepia. Sanguis Hirci. Mumia. Margaris. Reges { Orientale. { Occident. Entali. Dentali. Umbilicus Veneris. |
| | | | { Musculus. Zibethicus Castoreum Sperma Ceti } cum ping. |
| | | cum odore fragrantis. | { Scintillus. Lumbrici. Sanguisuga. Cantharides. |
| | | Blandiores. | |
| | | Acerrimæ Causticæ | |
| | { Oleosæ Crassæ { Tobeyacolla. { Adipes cum pauc. vol. { Terebræ, ut Serici foliæ, c. pauc. vol. | | |



CLASSIS III. DE HERBIS.

| | | | | | |
|-------------------|---|---|--------------------------|-------------------------------------|--|
| Herbæ sunt vel | 1. Aquosæ crassæ, seu Mucilaginosæ | Albæ. Alba. Tusilago. Verbasicum. | Volatiles & Oleosæ | cum acredine intensiss. | Origanum. Majorana. Serpillana. Thymus. Satureja. |
| | | | | cum acredine minori | Melissa. Galbanum L. Herminum. |
| | | | | cum paucis fixis | Rosmarinus. Salvia. Mentha {aquatica, {crispa. Menthastrum. Nepeta. Calamintha. Pulegium. Eupatorium. Hysopus. Folium. Dillanum Creticum. |
| | | | | cum multis fixis | Matricaria. Artemisia. Schaunanthum. Abrotanum. Marrubium. Ruta. Sabinum. Tanacetum {Pennis. {Roman. Absinthium. |
| | | | | cum resina vol. | Chamaejasme. Rorri. Folium Lauri. |
| | | | | cum vol. pauc. | Agrimonia. Iberis. Ruta. Chamaedris. Ribesum nigrum. |
| | | | | cum terr. & pauciss. vol. | Veronica. Hedera terrestris. Pimpinella. Euphrasia. Hypericum. |
| | | | | Volat. spirituosiss. cum acid. vol. | Cochlearia. Nasturt. |
| | | | | Volatiles acres | Erysimum. Persicaria. Cuscuta. Epithymum c. pauc. latiss. |
| | | | | Fixæ cum paucis volat. | Centaur. min. Card. Bened. Fumaria. Scordium. Lupulus. |
| Terres | 2. Salsæ, quæ vel | Cauda Equina. Alc. m. Palmaria. Sindis. Verga aurea. Bursa Pastoris. Verbena. Fol. quercus. Pyrola. Santula. Alchymilla. Filifolia. Polygnum. Adiantum. Fol. 2. Polytrichum. C. mch. Pylæus. | Blandæ | Purgant. | Volat. {Fol. Senne. Fixæ cum pauc. vol. {Soldanella. {Gratiola. {Nigella. |
| | | | | Laxantes | Mercurialis. Parietaria. Urtica. |

CLASSIS IV.
DE FLORIBUS.

| | | | | | |
|---------------------------------------|---|--------|---------------|--|---|
| Flores sunt vel | { | Salini | { | Volatiles Oleosi | { Lavendula. Rosmarini. Salvia. Chamomilla { { Romas. { vulgar. |
| | | | | | { Croc. Schananibi. Stachadis. |
| | | | | | { Caryophyll. l. Tunis. Liliorum Convallinum. Tilia. Betonica. |
| | | | { | Spirituosi blandi | { Caryophyll. l. Tunis. Liliorum Convallinum. Tilia. Betonica. |
| | | | | | Acres vol. & fix. |
| | | { | Mucilaginosi | { | |
| | | | | | cum Θ . fol. & fix. { { Papaver. { Pxon. |
| | | | | | cum mucilag. crass. { { Alsalv. hortenfi. { Verbasc. |
| | | { | Aquosi tenues | { Borrag. Bugloss. Cyan. Violarum c. Θ . vol. | |
| | | | | { | Terrei |
| cum austeritate { { Balsamiflorum. | | | | | |

CLASSIS VII.

DE SUCCIS, RESINIS ET GUMMATIBUS.

| | | | |
|----------------------------------|---------------------|----------------------------------|--|
| Succi, Resinæ & Gummata sunt vel | Volatilia oleosa | Gummi-Resinæ cum virtute laxante | <i>Ammoniacum.</i> <i>Gulbanum.</i> <i>Balaenm.</i> <i>Afa fetida.</i> <i>Sagapenum.</i> |
| | | Resinæ spissiores | <i>Anima.</i> <i>Cannamum idem ac anim.</i> <i>Sandarach.</i> <i>Alafix.</i> <i>Thui.</i> <i>Lacca</i> { <i>in granis.</i> <i>in ramulis.</i> <i>Succianum.</i> <i>Elemi.</i> <i>Tacamahaca.</i> <i>Caranna.</i> <i>Benzoe.</i> <i>Syrax.</i> <i>Pix.</i> |
| | | Resinæ liquidiore | <i>Terebinthina.</i> <i>Balsam.</i> { <i>Peruv.</i> <i>Copaiba.</i> <i>Liquidambra.</i> <i>Syrax liquida.</i> <i>Opobalsamum.</i> <i>Ladanum.</i> |
| | Salina | Blanda | cum amarit. intens. { <i>Myrrha.</i> cum pauc. viscos. vol. { <i>Campora.</i> cum mult. visc. vol. { <i>Opium.</i> |
| | | Purgantia | Fortia { <i>Eupherbium.</i> <i>Elaterium.</i> <i>Gutta Gamb.</i> <i>Scammon.</i> Blanda, Alor { <i>Socorin.</i> <i>Hepatica.</i> |
| | | Mucilaginosæ | <i>Saccharum.</i> <i>Glycerhiza.</i> <i>Mel.</i> |
| | Aquosa, qualia sunt | | <i>Gummi Arabicum.</i> <i>Tragacantha.</i> |
| | Oleosa crassa | | <i>Bisumen Judaicum.</i> <i>Calophonia.</i> <i>Cera.</i> |
| | Tetrea | | <i>Hedera.</i> <i>Sang. Dracou.</i> <i>Terra Japon.</i> |
| | Acido - Austera | | <i>Succus Acacia.</i> <i>Hypocistis.</i> † |

DE MINERALIBUS.

| | | | | |
|--------------------|--------|---------------------|--|--|
| Mineralia sunt vel | Salia | Volatilia | { Sal Ammoniacum. Serrax. Chrysocolla. | |
| | | | { Sal Commune. Gemma. Di. | |
| | | Vol. & fixa | { Lapis Prunella. Alumen { Rupesc. Romanum Plumifum. | |
| | | | { Calk viva. Arsenicum {album. rubrum. | |
| | | Volat. Corrosiva | { Auripigmentum. Cinnab. fossilia. q. sublimatus } precipitatus } Casar. & | |
| | | | { Blanda { q. dulce. | |
| | Saluta | Volatilia | { q. viv. & vng. Antimonium crud. c. test. | |
| | | | { Lapis Armen. Lazuli. Crocus Metallorum. Diaphoreticum. | |
| | | Vol. Purgantia | { Lapis Armen. Lazuli. Crocus Metallorum. Diaphoreticum. | |
| | | | { Es vislum { Chalcid. { Ungaricum. Romanum Es viride. } album. | |
| | | Oleosa seu Pinguis | { Sulphur c. acid. vel. | |
| Mineralia sunt vel | Terra | cum nullo Alkali | { Lapides calamin. crystalli pretiosi Pungia. Opuscula. Turba. Turba mineralis Pompholyx Bulbus calcis. Pumex. | |
| | | | { Aurum f. l. Argent. al. Corallia alba & rubra. Uncernu foss. Bolus { Vulg. Armen. Alb. | |
| | | | { Terra Sigillat. { nostr. Lithargyrium. } Lemnia. Cerauja. Adrianu. | |
| | | | { Plumbum { Ustum. Saccharinum. | |
| | | | { Chalybs & Ferrum. Crocus Mart. Lap. Hamatit. Magnes. | |
| | | cum alcali volatili | { Lapis calamin. crystalli pretiosi Pungia. Opuscula. Turba. Turba mineralis Pompholyx Bulbus calcis. Pumex. | |
| | | | { Aurum f. l. Argent. al. Corallia alba & rubra. Uncernu foss. Bolus { Vulg. Armen. Alb. | |
| | | | { Terra Sigillat. { nostr. Lithargyrium. } Lemnia. Cerauja. Adrianu. | |
| | | | { Plumbum { Ustum. Saccharinum. | |
| | | | { Chalybs & Ferrum. Crocus Mart. Lap. Hamatit. Magnes. | |

LABORATORIUM PARISIENSE.

INTROITUS.

Quantoperè peregrinationes & itinera, versus Exteros suscepta, elegantioris Literaturæ Studiosis, cumprimis autem Artis Medicæ Cultoribus, sint proficua, præter alios Willius in tribus Dissert. de Itineribus Philiatrorum Germanorum & Thomas Bartholinus in Tractat. de Peregrinatione Medicâ jamdudum ostenderunt. Prout autem varia sunt peregrinantium proposita scopique diversi, ita varia quoque illic requisita & cautele observanda sunt. Quemadmodum enim Theologo futuro ea, quæ sacra concernunt, templa fanaque publica, ritus & Oratores Ecclesiastici horumque gæsus cura cordique sunt: quemadmodum & Legum Statusque publici periti Regum Principumque Anlas & Curias præ aliis frequentant, ita Medici eorumque Cultores de Hortis publicis, Laboratoriis Chymicis, Theatris Anatomicis & Nosocomiis invisendis magis sunt solliciti, quæ Lutetia Parisiorum, in Suburbio S. Victorii, conjunctim & simul spectari possunt, cum in atrio Horti Regii non tantum Laboratorium Chymicum, sed & Theatrum Anatomicum & Museum Curiosum: E regione vero maximum S. Ludovici Nosocomium spectentur. Ut autem agris hic denso agmine decumbentibus eo facilius & promptius succurri possit, hinc laboratorio proxime adjacet Pharmacophylacium pauperibus dicatum, in quod omnia illic à Chymico Professore elaborata reponi solent, ut è seq. Inscriptione foribus adscripta, elucescit.

REGIS CHRISTIANISSIMI
LUDOVICI XIV.

IMPERIO,

ET

EMINENTISSIMI CARDINALIS

MAZARINI

MUNIFICENTIA,

ANTONIUS VALLOT

ARCHIATRORUM COMES

OFFICINAM HANC PHARMACO-CHYMICAM

IN PAUPERUM SUBSIDIUM ET PUBLICI COMMODI GRATIAM

EXSTRUXIT ET INSTRUXIT.

Ex quibus laboribus Chymicis, pulchre illi institutis, Pharmacopoeiam
dam Regius designis solent, ut plurimum tamen ad sub directione
Horti Regii Inspectoris fieri, è sequenti Programme, ex Prodrōm
mentari in Petri Severini Medicinam Philolophicam, à Wilhelmo
lomo editi, petito videre licet :

AUSPICIIS REGIIS WILLIELMUS DAVISSONIUS

Scotus, Confiliarius & Medicus Regius,
Horti Regii Plantarum Medicinalium
PRÆFECTUS,

Botanicum & Chemicum Fontem aperiet cognitionis & scientie us-
pidis. Ex illo studiosum cultum, novum ordinem plus septuaginta
tarum plantarum accessionem videbunt. Ex hoc Animalium, ve-
getabilium & Fossilium Analysin accipient. In Antimoni præparatione
exaltatione multus erit: quia non sufficiunt nomina ad tam divitiarum
ram appellandam, quæ principium vitæ, balsmum & medentem munus
in se habet. Verum verum dico. Non est sub cælo medicina sublimior.

In Aula Horti Regii Plantarum Medicinalium, quæ Parisus est, 1648.
23. Jul. & deinceps horâ sextâ matutinâ. Anno 1648.

In Suburbio S. V. A.

*Idem temporibus subsequētibz quoque ad nostrum usque seculum ad-
sinuisse vel exinde constat, quod Botanicus toto Orbe Celeberrimus, Jo-
Pitton de Tournefort, præter Scholas & Demonstrationes Botanicas, non
quam non elegantiores etiam Medicamentorum Chymicorum præparati-
Auditoribus suis instillaverit: quarum descriptionis quam laudem præ-
dem, una cum Aetiologiis & usibus, a Venerando Dn. Parente meo ad-
tis, obtinuerim; haud ingratum fore duxi harum rerum Curam, si ead-
dem reliquis Tournefortii laboribus, in compendium reductis, hæc me-
ta vero, non alium in finem, quam ut propriis aque ac Commilitonum studiis
velificando gloria DEI T. O. M. Proximique commodum indies magis
magisque amplificetur. Dab. Giesſa è Museo, die 18. Martii A. 1715.*

CHRISTOPH. BERNHARD. VALENTINI, M. C.

LABORATORII PARISIENSIS

PARTITIO I.

De LABORIBUS ANTIMONIALIBUS.

Antimonii virtus inexhausta est, cum tot ex illo Medicamina Emetica, Purgantia, Diaphoretica, Antifebrilia, Nervina, Cathartica, &c. parentur, ut integrum ferè Myrothecium portatile quis exinde construere possit. Agmen inter illa ducit

I. *Crocus Metallorum,*

Dr. Autor ita parare solebat:

℞. ♂ & ♀ partes æquales, M. & materiam cochlearis ferreæ per vices injiciendo in mortariò ferreo ignitò detrita. Operatione peractâ materia refrigeratâ liberetur à Scottis, & vocatur Epar Antimonii ob colorem obscurè rubescentem. Hoc Epar ♂ pulverisatum & in aquâ solutum ad fundum dilatâ sinit pulverem magis flavescentem, qui Crocus Metallorum vocatur.

Ratio procedendi.

Quandoquidem particule Antimonii ♂ reze & salinæ (à quibus virtus ejus dependet) complures terreis & metallicis implicite sunt, hinc clavi quadam opus erat, quæ texturam ejus reseret, & particulas activas extraheret. Hunc in finem ♀ ana additur, cujus particule cum ♂ sub accensione, ut secus ac cum ♀ communi in pulvere pyrio, fragorem quasi fulminantem edunt, texturamque Antimonii aperiendo & laxando in causa sunt, ut reliquæ particule salino-sulphureæ sibi jungi & pulverem hunc obscurè rubescentem aut flavescentem, ope reflexionis luminis, constituere valeant.

Ufus.

Crocus hic sors & seaturio est Emeticorum præstantissimorum, quamvis ipse in substantiâ, quod auctor materiam minus tuto propinquit, sed tantum in infusio, hæc ferè ratione:

℞. Croci Metallorum. gr. iv. vel v. infund. per noct. in Vin. Rhen. aut Malv. ꝑij. vel ꝑiij. stent in loc. cal. manè filt. per chartam. Dos. ab ꝑi. ad ꝑiij.

Infusione fit *Aqua benedicta Rulandi*, & si infusio in + fiat, facile cum saccharo q. s. in Oxysaccaro aut Emericum, aut *Syrupum emeticum A. Sale* converti potest. Externè tamen in substantia Clysteribus acutioribus, pro excitanda Apoplecticis & Lerhargicis, potest addi seq. in modum.

℞. Vini alb. lib. j.
bulliat in co sem. Coloc. in pet. lig. ꝑij. add. Croci metall. 3℔. M. F. Clyster.
Ad datur etiam in Collyriis ad complures oculorum affectus; unde & Abyssinos ex ♂ cohol suum, quo opè penicilli tunicam annaram nigredine inficiunt) præparare DN. LUDOLFUS in Comment. ad Hist. suam Æthiop. adstruit.

II. *Tartarus Emeticus.*

A.

℞. ♀ candidissimum crudi tibi.

Vitri ♂ tibi. M. in olla vitreata, cui affunde aq. fontanæ pint. iv. Digere igne lento per 8. dies. Postea materia fervens trajiciatur per pannum: Liquor trajectus reponatur in hypocausto & post spatium aliquot horarum crystall. ad vasis latera concretescent, qui parentur. Liqueorem residuum ad tertiam partem evapora, & de novo alii crystalli concretescent. Evapora denuò, ut reliquos extrahere possis.

Ratio procedendi.

¶ Cum Vitro ♂ digeritur, ut non secus ac in priori operatione particulis ♂ reze imprægnetur, is cum vino emeticum in acceptis ferendam esse, vel exinde parat, quod in ♂ crudo, ubi nondum extra-

quæ præparanda erant, necessarium erat. Non enim omne & Regulæ Antimonii Δ abla-
scibile, infusiones & pocula emetica & Reg. δ parata, tum *Regulæ δ Medicinalis*, à multis
hactenus contra febres intercurrentes in arcanis habuit, testantur, utpote qui præter sudorem sæpe vo-
mitus quosdam, non sine euphoria, movent, & secundum VIGANI ductum ita paratur:

℞. δ . part. j.

Θ. commut. part. iv.

♠. part. v. M. & fundantur in Regulum.

Usus

♠ Diaphoretici ex ipso nomine & cognomine ignotescit. Quamvis enim WILLISIUS in Phar-
mac. Ration. Sect. V. Cap. I. virtutem ejus diaphoreticam in dubium videatur trahere, nesciendo cuius-
modi ejus particulæ vis hæc debeat attribui, adeoque pro sistendis fieri aut sanguinis fluxionibus tantum
commendari, eo quod hæc terra propriè salibus orbara alienos (quibus fortè in corpore nostro oc-
currit) acidos siles amabat, sicque absorbendo magis agat; atramentum & hoc intutu reliquos hu-
mores circūstantes ab acido vindicando & ad liberaliorem transpirationem disponendo diaphoretin,
experientia telle, egregiè promouet, eaque de causâ in febribus intermittētibz, ETTMULLERI
verbis, plus constat, quoniam speciem amfebrilem Crolii, aut Strobelbergeri, cūprimis, si cum
Θ. armoniaco (in Hæctica cum Θ sociato) propinetur. Non minus in febribus continuis, tam
benignis, quàm malignis petechialibus, pleurinde benigna & malignâ, erysipelæ aliisque a sangui-
ne plus minus humore oondi nūtiis, salibus volatilibz C.C. succini, cinnabamnis, & quandoque
spatis martiatum, est egregium. Quidquid & in Luc Venerâ diaphoreticum non contemnendum
constituit, cūprimis & Regulo δ . ad ductum Autoris nostri paratum, & *Cruisæ δ alis* nomine alio-
quin cognitum, utpote quod præter effectum diaphoreticum salivationem quandam, etia ibus aliis
cumfacere, exorare dicitur ab ETTMULLERO, in Collegio Chymico. Dosis ejus est δ ad β ss.
Præscribitur ita:

℞. δ . diaphor. δ j.

Θ. vol. CC. gr. v.

Ther. cod gr. ij. M. F. Pulv.

IV.

Diaphoreticum Martiale anticacæcticum.

℞. δ crudi pulveris.

Squamæ ferri ana p. æ.

M. probe atque in crucibulo, quod expone igni fortissimo & materia liquecet, vel in massam
concreta. Hæc fluens ex crucibulo in pavimentum projicitur, ut refrigeretur: abhinc pulverisa-
ta atque cum duplo δ aqua detonatur, prout in præcedente δ . diaphoretici præparatione fieri so-
let. Tandem aqua δ fusa in multa plumbis lotionibus edulcoratur. Quod si verò materia hæc
in massam concretæ, hæc per integram horam in igne relinquatur & probe ignatur, hocque facto præ-
paratur ut ante dictum.

Ratio procedendi

Eadem, quæ in præcedenti operatione, subest, nisi quod ad majorem vim absorbentem medica-
mento consiliandam addeatur δ . acido p. n. in hypochondrio & prunis vis nidulanti chronicoque
morbo alio quam maximè contrarius.

Usus

Ejus in casibus & edulcorati, in istis, dysenteria malignâ omnibusque affectibus citancis, scabie
& similibus non potest decantari potest a LUDOVICO, in Pharmacia moderno sœculo applicanda, ut &
Miscellaneis S. R. I. Academ. Nat. Curios. Dec. I. Anno VIII. Obf. LXV. Dosis est δ j. ad β ss. Præ-
scribitur ita:

℞. δ . diaphor. δ ris.

Flor. δ . β ss. M.

D. bis de die in scabie.

V.

Regulus Antimonii δ alis.

℞. Clavatum ferreorum tssb. in crucibulo cooperto igni fusionis exponatur, donec exactè
fuerint igniti: eorum indicium est, si forcipe exempti & aeri expositi non statim marcescant. Tum
adde δ β ss. fundantur simul per horam circiter. Postea inque per vices Θ. pulvis in pulverisati
præter præter pullos octo: relinque adhuc per quadrantis horæ spatium in igne: abhinc mace,
vel mortario ferreo, vel cono fusorio. Refrigeratum Regulum libera a scoria, atque denique in

igne funde addende, et ante prolatto aliquot ① & si lubet, immixtis hanc preparationem
pete, ut polior & conspectior fiat stela.

Ratio Processus.

Quum $\frac{1}{2}$ facit, $\frac{1}{2}$ vero difficulter in Δ fit, hinc non simul findi, sed seorsum primò
defici debet. Abhinc singula in eam massam, quum $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ & $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$, in radice con-
stant, & se invicem facile uniant, quod à Φ fixo postmodum absorptum, leonias abit, e quo
haud difficulter præcipitari potest.

 \mathcal{V}_{145}

Reguli hujus tri expetitur à nonnullis ad antimonium diaphoreticum male, exinde per
tonationem, cum triplo ☉ parandum: sed præstat compositio Autons. Reliquas yentes cum
gulo & vulg. & simplici communes habet.

VL

Sulphur auratum †.

℞. Scorias Reguli 3 vel croci metallorum, vel & animonii diaphoretici, pulveris ac
in aqua communi, qui filtratæ affunde acetum destillatum, & pulvis rubeus ad fundum præci-
tur, qui exsiccat Sulphuris aurati g nomine venire solet.

Ratio procedendi.

Quandoquidem Scoriae, in Regulorum preparatione remanentes, & in similitate con- fusori-
peribiles, nihil aliud sunt, quam salia alcalia sulphure &c. quod absorpserant: in regnata, hinc
hinc separationem & precipitationem solutioni illarum contrarium quod, si a seorsum in regna-
erat, iuxta regulam Chymicorum: Similia similibus solvuntur: Contraria contrariis precipitantur.

 \mathcal{U}_{MS}

Admodum variat, pro diversa ætate repetitione. Etenim præcipue in vomitionum, & in diæis purgans per inferiora: ex ultimis certè ratione instituta, anteprepositum nobis limum, Panac. Glauberi analogum, obtinebis, ad pauca tantum extra propinquum. Solutio stercorum, seu hæmorrhoidum per instrumentum Glauberi, aut pholam oblongior colloquenda, sub forma suffusi mensuris prælicit: In Clysteribus alvum ciet: Lotione autem scabiei & uke antiqua cacotheca, imo ipsam granam infantem abigit, cum partibus salinis abstergeantur, sulphureis verò balsamicam virtutem exferat.

VIL

Cinnabaris Antimonii.

[illegible]

Ratio Processus

Elegantissimè confluit in seqq. Spiritus sc. acidus in ☿ (ē corpore ☿ & spiritu ☿ in ☿ concentrato constante) ignis beneficio exsolutus & resolutus rodit partem metallicam seu aërealem antimonii corrofamque secum in receptaculum precipitat, ut sita maras abeat in liquorem erasilem, cum, odore admodum fulfuris, ob ☿ & sulfuris emulsionem, grudentem, qui ob similitudinem, quam cum butyro ratione consilientie habet, *Butyrum* ☿ vocatur. Interea ☿ seu argenti vivum à sulfuris ☿, partem metallicam rodendo dissolvit & à vinosis ☿ & à viscosis ejus liberatis, parum sub antiqua forma cum butyro ☿ prodit, partem se cuius ☿ antimonii communis.

quæ duo sub eadem in tertium, ex illa compositum, in Cinnabari 3 abeant.

Uſus

Horum productorum & Pharmacopœis & Medicis admodum proficiuus eſt. Priores enim unicum in hanc operationem nummum unalem impendendo, ex calculacione LUDOVICI, juxta communem Metropolitanarum, centum Imperiales inde lucrantur. Medici pharmaca inde contra morbos conrumaculinos, tam internè, quàm externè adhibenda obtinent. Illic *cinnabari* & in omnis generis convulſionibus & ipſo caduco medicamentum præbet nobiliſſimum, adeò quidem, ut elogium illud, quod trium Imperatorum Archiater CRATO cinnabari nativæ, quæ Magnetem epileptiæ vocat, tribuit huic cinnabari & etiam debet dicat ETTMULLERUS. Cumprimis autem epileptiæ accidentali omnibusque doloribus viſcerum fibrarumque nervoſarum ſpasmoticis valdè reſiſtit, ſicque in Colica convulſiva, à ſumis & evaporacionibus mineralibus oriunda (in der Verſtärkung) in tremore aurificum à frequentibus & evaporacione, in doloribus hyſtericis & arthriticis tam fixis, quam vagis, egregie ſeſe gent. In eryſipelate, in ſpecie caput affligente aliisque capitis affectibus tantum valet, ut à Præſtico quondam ſeliſſimo D. MICHAËLE in ſpecificum cephalicum recepta fuerit. In febris, cumprimis malignis, ſua quoque laude non caret, adeò, ut POTERIO ſudoriferum antiſepticale dictum ſineat. Multum quoque in morbis puerperarum præſtat, non tantum dolores poſt partum & ſpasmus uterinos liſtendo, ſed & partum ipſum, ob contractionem uteri ſpasmoticam retardatum, promovendo. Doſis eſt ʒſ. ad ʒj. ſive ſola, ſive cum ʒ volat. CC. ſuccini &c. detur, quæ ſine ullo periculo illi combinari poſſunt, dum e contra alia ſalia fixa ipſi non ſint contraria, ne in concretum & æ ſimile cum illis abeat. Præſcribitur ita:

ʒ. Cinnab. ʒ. ʒj.

ʒ vol. CC.

Succini ʒʒ. gr. v.

Ther. eccl. gr. j.

M. pro doſi.

Externè Butyrum & poſſiſſimum ad excitandos fonticulos, ad eradicandos abſceſſus malignos, carbunculos peſtilentes, gangrenam & ſphaeculum ſummopere laudatur, de quibus pluribus in Prax. intellib. Part. 2. Chirurgicè agitur. De ſpiritu ʒ Philoſophicò, & vitz & Bezoardico ſimiliter in de præparandis eorumque uſibus in ſpecie jam, Autoris noſtri ductu, paucis adhuc tractandum eſt.

VIII.

Bezoardicum Minerale.

ʒ. Butyr. ʒ ʒj. affunde per vices ʒ ʒ. ʒxj. poſtmodum ʒ ʒ abſtrahitur igne vehementiori, ut materia ſicca remaneat, quæ albida eſt; hinc pluribus locutionibus edulcoratur, vel cum ʒ cum eadem digeritur & abſtine deſlagatur.

Aliàs autem cum Croco metallorum ita fit:

ʒ. Croci metallorum ʒj.

ʒ ʒ. ʒxj.

M. in retortâ: ebullitione & ſumis ceſſantibus procedatur, ut ſupra.

Ratio procedendi.

In huius præparatione WILLISIUS obſervat, quod, dum liquores hi acerrimi committuntur, ſales ſibi ſibi vicinè occurrentes ſtriſtè combinantur. Inreſt particule ſulphureæ, quæ uberi copâ ſuppetunt, præſus excluſæ & manu qſ. miſſæ avolant, arque talia quædam corpuscula ſecum auferentes calorem & ſumum (qſ. aliquid actu combureretur valdè tetrum cietur: quibus abactis ſalina reſidue cum paucis & terreis ſtriſtè combinantur, demumque ignem paſſæ, ut ʒ emeticum penitus exhauriat, arque ſalia aculeis corroſivis priventur, diaphoreticum in igne conſtituunt, quatenus ʒ medicamenti corporis noſtri ſalibus occurrendo & qſ. imbibendo ſanguinis & humorum circulantium compagem laxant, ut particule ſeroſæ eò facilius ſecedere poſſint.

Uſus

Inſuit Bezoardicum Minerale optimum eſt ſudoriferum in febris omnis generis, cumprimis malignis, petechiis & ipſa Peſte: ſi quidem in Peſte Neapolitana egregie proſuiſſe dicitur. Valet quoque à icabie & aliis morbis cutaneis. Doſis à gr. vj. ad gr. x.

Ufus

In tollendis obstructiōnibus vulgo ita dictis viscerum inflammationibus, hæcica & omnibus pe-
thorici affectibus (in quibus *antihæctico* POTERJI præstat est egregius. Datur ad gr. viij ad x. & plures.

PARTITIO III.

De

SPIRITIBUS CHYMICIS.

I.

Spiritus salis crocum redolens.

℞. ☉ marini decrepitati & pulv.

☉ alb. ana. Misce & destilla per Retortam igne vehemen-
tissimo, prodibit ~, & caput mortuum, calcinandum in crucibulo, elixivandum & evaporandum
aliquoties, dabit ☉ *mirabile Glauberi.*

Ratio Processus.

Quamvis Sal calcinare atque fossile spiritum quoque fundant acidum, attamen adeò fragrans non
est, quam ~ ☉ marini. Hic ergo fideliteratur, sumendum est ☉ marinum, quod magis sulphu-
reum est. In sale enim marino ☉ vivum, perfectum & inflammabile reperiri testatur anatomicus ejus
Chymica. Decrepitationis ratio autem est, ut prius ☉ rollatur humiditas aquosa, sicut in destillatio-
ne ~ ☉ quoque cum ☉ observatur. Tandem adiciunt ☉ album, pro medio sc. per quod salis particule
mox discontinuari solent, ne, si diutius in igne subsistat, liquefeat & fundatur: ad quod alii O. aur ar-
gillam, lateres & sim. in bolos formata recipiunt, quæ omnia rejicit BARNERUS ex eo, quòd ☉
quæcumque terrea hæc in bolos formantur, subdestillatione deinde ☉ decrepitatum nova humiditate im-
buatur: unde Autor nosse alibit ~ ☉ communi coem pulverisatam substituit.

Nec *absq* ☉ aque incommodum esse, cum verendum sit ne ~um suum simul fundat, sicque
Spiritus ita ☉ salis, ut SCHROEDERUS eundem vocat, non verò genuinus ~ ☉ eleverit. Me-
tus enim in hoc profusissimus est, eum ☉ longe fixioris sit nature, quam ut ☉ multum ~um suum destil-
lando cedat. Licet ergo ☉ ☉ quodammodo diluat ~, ☉ nequequam tamen de ~ ☉ genuino
simul prodit, adeo quidem, ut si ~ ☉ rectificatus affundatur ☉ com. hæcque simul destillentur, ~
☉ saltem prodeat, teste ETTMULLERO in Comment. ad Pharm. Ludov. pag. 144. edit. Westphali:
ubi simul de variis modis, quibus *Spiritus salis dulcis* redditur, agitur, quos inter optimus est, qui fit
cum duplo ☉ eum aliquoties cohobando, quem B. VALENTINUS *aquam suam temperatam* vo-
cat. Interdum tamen cum ~ quodam appropriato dulcificatur i. unigatur, sicut in Peste cum ~
theriacali dulcificatus optimum est preservativum & curativum.

Ufus

Spiritus Salis non tantum in Chymicis, sed & in Foro Medico magni semper æstimatus fuit. Ille
enim menstruum egregium, ipsum enim ☉ solvens, præbet. Hic tumum est refrigerium in effe-
rescentis febribus, destruendo refrigerandoque bilem efferratam saltem alcala in corpore humano nimis
debauchantia. Hinc in Julepis suum compescit, tantum hypochondriacorum, quam febricitantium. Porò
quoque diureticum præbet in hydropse egregium, cum prius si cum ☉ quodam fixo in ☉ saltem com-
muneur. Tandem in confortando tono stomachi ~ ☉ dulci nihil est præstantius ad provocandum ap-
petitum, cruditatem nidorofam corrigendam, nauseant & vomitum abigendum. Dos is a gr. x. ad xij.
imò plures adiciendæ, in velticulò appropriatò danda.

II.

Spiritus ☉ oleum ☉.

℞. ☉. ad albedinem calcin. q. v.

Pulverisat, & inde Retortam lutatæ, atque igne reverberii destil-
la per triduum: prodibit primò ~ & tandem ☉, ☉ in recipiens. Quod remanet in cucurbita, est ☉
Colcothar.

Ratio procedendi.

Quam ☉ non calcinatum, ob ☉ conjunctum facile colliquescens, nullum omnino Spiritum fundat,
imò etiam Retortam disumpere faciat, hinc per calcinationem illud primò dephlegmandum erat. Qui-
dam tamen quia ☉ conservando destillationi illud prius committunt, quam Autor nosse ita instituit:

☉. ☉ lib. iij. inde cucurbita vitrea, pone super ignem arenæ ada-
pra capitellum & recipiens. ☉ primò solvetur, & postmodum ☉ destillabit in recipiens. Quod

remanet in cucurbita, est ☉ *albus.*

Utrobique autem non opus est, ut ad partium disconnectionem faciliorem & fluorem coercendum
corpus aliud terreum, aut salinum, ut in destillatione ~ ☉. ☉ &c. observantur, addamus, cum ☉ suf-

ficientes particulas metallicas terrestres in se continet, quæ impediunt, quòd semel calcinatum resoluatur
colliqueat. De æthero ~ & ☿ non nisi gradu majoris vel minus aciditatis differunt, ratione ætheris
autem conveniunt, cum ☿ tantum aliquot particulas metallicas secum rapiendo gravius & concentratius
fit, ut levi diffusionis facile in ~ mutari possit & ~ vicissim facile in ☿ ☿ (vulgò sic dictum
concentrari possit.

$$U_{\text{fus.}}$$

Omnium horum præparatorum est & ferè idem est ac ~. ~. nisi quod ~. & maiorem adstrin-
gent & acrimoniam conjunctam habeat, eaque de causâ pulmonibus æquè ac de ~. noceat, ~.
utroque ~. ~. illi substituendus, illi in pleuritide, hinc dentium nigredine & flavedine tollenda, qui
vis præter hoc in casu ab acido ejusmodi profusè abstinere, ne ante congruos annos edentuli fiamus, &
ardore lebrum & compendia sui ~. & cum eo parata Tinctura florum belidis egregie conducimus.
In stomachi affectibus, apæpsia, anorexia & similib. ~. ~. tribus aut quatuor partibus elix. propriet.
menthæ misceri poterit, cum primis mingæus, seu ut loquuntur, *dulcificatus*, cum V digerendo &
cohobando facîle parandus: quâ ratione & ~. & dulcificando Spiritum ~. volatilem suum efficere so-
nat VIGANUS, hæc ratione:

Re. $\odot \oplus \xi_{11}$ affunde V^* . optima ξ_{VII} .

hinc calor oritur inrensissimus, abique ebullitione. Aptetur excipulum & Δ. lento vel MB. vel A. strahatur ad dimidias. Hinc refrigerant liquores, tumille, qui in excipulo est, tum qui in Retorta reman-
sit, confundantur. Remedium est optimum in omnibus hæmorrhagis, tam internis, quàm extrin-
siccis, quod aliàs *Aqua Rabelii*, famosi quondam Circumforanei, vocatur

Si cum dulcificetur, *Spiritus aperitivus* PENOTI audit, quia D. MICHAELE ita parabatur

8. *G. calcinari*, part. üj.

⊕ $\frac{1}{2}$, ottimic' depurati p. 1.

Silicium fluviatile. p. vi.

dehinculentur Δ. fortissimo per Retortam, & prodibit ~ Θ. admodum remperatus, in defectu mentum
malo hy pochondriaco & icorbuto cum vehiculo convenienti dandus. Valet etiam in hydropo curam
alique obstruccionibus viterum, quas vocant Dosis est ʒss. ad ʒi. E capite mortuo elixiatur c. p.
viali Θ dig. solum, a gr. vj. ad xij. purgantibus pro stimulo adic. & cum epar. rubr. ad dictis modo aff.
bus propinandum.

III.

*Spiritus Salis Armoniaci volatilis, omnibus hactenus
cognitis penetrantior.*

取 0.1 米。

lapid, hæmarit, ana.

contunde separatim in mortariò marmoreò: Misce & per spatium 14. præterpropter dierum in ℥ repone. Postmodum inde Retortæ vitreæ, atque in ℥ . destilla igne primum lenio & prodibit ℥ . Postmodum adaptetur vas recipiens & igne ad 4. gradum aucto egreditur ℥ admodum penetrans, quæ eximendus & usui servandus. Abhinc caput mortuum, in Retortâ residuum, fractâ hæc eximur & pulverisatum in cellâ reponitur, donec liqueat: Tum ex cò, mediante igne suppressionis, elicitur Spiritus Salis. In qua tamen operatione attendendum, ne ⊗ *, qui adhuc in capite mortuo resitat, cum ⊗ misceatur. Proinde primò prodicens gustu explorandus est, nec recipientis vas lutandum, quàm ⊗ percipiamus. Ultima hæc operatio multoties potest iterari & ℥ per ⊗ elici. Hic ⊗ cum ⊗ *, equali pondere mixtus dat *Tincturam caelestem*, mixturâ ad omnem stomachi vitia convenientem & omnibus stomachicis palmam præripientem. Si ex capite mortuo novum ⊗ destillare animus sit, adde ad quamlibet ejus libram ⊗ * lbj. atque ℥ m, ut ab initio, proceditur. Hic processus potest continuari in infinitum ferè, & post multas operationes, si libet, caput mortuum in crucibulo igni expono, & exinde paro *Crocum* & *adstringivum*.

Ratio procedendi.

Ad genuinam ~Θ* ejusque de stillationis et iologiam explicandam consideranda primū est Θ* nostrata (nam Veterum nativum erat) preparatio, quæ ex Θ.com. 7 & 8. nec constat. sub qua Θ. vol. urinz & fuliginis, dum ē evaporat, se jungit cum acido Θ.com. & ambo abeunt in Θ. sūm, seu neutrum, quod vocatur Sal armoniacum. Quod si jam sal huius nil nisi lapidem hæm. item cum A. a. ore, aurilimarum Θ. cum ZWELFERO addamus, primò quidem ~ quodammodo alcalinus seu potius Θ. sūm prodit, alter vero, qui sequitur, nil nisi ~Θ. est, cum hæmariæ aut Θ. addita tantum ad dis continuationem particularum Θ. * faciant: nisi fors dicere velimus per disturnam illam 14. d. e. rum digestionem temperaturam magis resolvī, ut Θ. vol. Θ. in primā operatione quodammodo liberetur & elevetur. Unde BARNERUS ~hunc ad acidum refert. Quod si verò ~Θ. * prius alcalinum & urinosum desideremus, aliud potius alcali est adiciendum, quod Θ. commune in Θ. * solum absorbeat aque Θ. vol. urinz & compedibus suis liberet. Hunc in finem portio analca, auri pl. * alci vivæ ad datur, au. & Θ. ♀ ana, vel si Θ. ♀ tumis pretiosum esse videatur, cinerum clavellatorum portio aqua- lis, sicque levi ca idē te vel carbonum calore Spiritum obtinemus penetrantissimum, hæc tamen cum differētia, ut si cum calce viva fiat operatio Θ. * merum fundat spiritum. Sin cum Θ. ♀ aut cineribus clavellatis, magna ejus pars sub *Florum* Θ. * formā se silit.

۲۷

Ufus.

Ufus ~ Θ * aëdior, prodest cum ~ Θ effectibus. Alter, scilicet ~ Θ * urinosus, sive volatile ma-
culatum est, omnia fere rebus volatilia superans & cum particulis oleosis destitutum sit, in morbis etiam
calidissimis, (quos per subitaneum sudorem curat) innoxium. Diaphoreticum igitur optimum est in
febris, tam intermittentibus, quam continuis malignis. Illic & tertianam & quartanam curat, unde
~ antiquarum D. MICHAELI dicitur. Hic in malignis adeo proficius est, ut Pesti etiam pestis sit, atte-
stante ZWELFERO & ipsa experientia. In Pleuritide maligna ~ uni hunc admodum proficu-
um observari. In aliis quoque inflammationibus internè & externè prodest. Urinam valde movet,
unde LIPSIUS der Sauff: Spiritus dicitur, quia \square potatibus movet. Adhuc status discutit & nervi-
nus est, in cardialgia, passione hysterica, Colica & similibus egregius. Menses etiam movet, præmis-
sis tamen aperientibus fixis, tam internè datus, quam externè per instrumentum GLAUBERI vapore-
tensus adhibitus. In Scorbuto pariter omnibus palmam dubiam reddit. Dosis à \mathfrak{zj} . ad $\mathfrak{z\ss}$.

IV.

Spiritus Terebinthinæ, & Terebinthina in ∇ solubilis.

$\mathfrak{z\ss}$. Terebinthin. lib. ij.

∇ . Font. lib. v.

Θ \mathfrak{q} . optim. $\mathfrak{z\ss ij}$.

M. & in Alembico destilla per balneum Mariæ: prodibit unà eum co-
poso \mathfrak{q} ~ Terebinthinæ optimus, coloris aquei, saporis & odoris grati. Peractâ destillatione (cuius
indiciū est, quando nulle stræ amplius apparent) à \mathfrak{q} separatim ope infundibili. Tum residua
aqua lactescens decantatur à *Terebinthina casta*, fundum occupante in Alembico, filtratur ac evaporatur
ad consistentiam saporis molli, nomine *Saponis alcalici* veniens. Ex Terebinthinâ coctâ autem vul-
gari modo vatulo coloris *Olea Terebinthinæ* destillari possunt.

Ratio procedendi.

Aciditur hic alcali, quod retinet crassius & ipsius inquinamentum oleosum terebinthinæ, simul-
que hebetat acidum ~ ut Δ volatile penetrans & efficacissimum prodeat: non secus ac è succino, cui
similis est terebinthina) Θ vol. simile obineretur.

Ufus

Ejus in affectibus renum & vesicæ non tantum, sed & pulmonum læsionibus internè est laudatis-
simus. Externè vi balsamica in vulneribus, cum primis nervorum, neminem deserit. Dos. g. v. ad \mathfrak{zj} .
in vitello ovi

PARTITIO IV.

De

TINCTURIS.

I.

Tinctura & alcalina.

$\mathfrak{z\ss}$. \mathfrak{q} . quid. pulveris. atque lento igne sensim exsiccâ, quousque cinereum colorem obtinuerit. Postea
misce cum æquali pondere Θ \mathfrak{q} . Multuram funde in crucibulo, atque per spatium 3. horarum in Δ relin-
que. Hinc effunde in mortarium marmoreum adipe illitum, ut induretâ. Tum pulverisetur statim ac
pulveri calenti adhuc affundatur ∇ . defæcatissimus, ad eminentiam 3. vel 4. digitorum, mactacium pro-
bè obturetur, sicque ∇ . colorem pulpureum mox induet.

Ratio procedendi.

Ur Δ & tincturam suam eo facilius impetiat, præmissâ tostione funditur cum Θ \mathfrak{q} , quod tan-
quam menstruum sem-universale extractionem ejus juvat. Hinc mirum non est ∇ rectificatissimum ab eo
statim tingi, quamvis & huius partes Δ rez, ut in Tinctura \mathfrak{q} , multum ad rubedinem ejus contribuant.
Nec obstat dari etiam *Tincturam & cum acido*, quam Autor noster quoque habet & ita parat:

$\mathfrak{z\ss}$. Croci metallor. $\mathfrak{z\ss ij}$.

Affunde ~ + penetrantissimam ad supereminentiam 3. vel 4. digitorum, & post digestionem 3. vel 4.
dierum evaporetur ad consistentiam extracti. Hinc affunde ∇ defæcatissimum ac digere.

Quod enim Θ \mathfrak{q} agit in priori descriptione, hoc Θ fixum sub detonatione jamdum egerat in cro-
co metallorum, quod pariter tecludit texturam & ejusque Δ extravertit. Aliâ enim Δ ra per acida te-
cluta non tam per solutionem aut extractionem, sed per solam substantiæ trialis corrolionem fieri
MULLERUS inde probat, quod Δ , quod à menstruo acido intactum relinquebatur, tali solutio-
ni partim supernatet, partim & frustulis insit crustæ adhæreat.

Ufus.

Tinctura & alcalinalaudatur à Chymicis in curatione morborum chronicorum, obstructionibus
F 2 visc-

Dispositum lentigulosum, donec purpureum, et tunc elegantem spiritum extrahent. Liquor fit
 vir. Scilicet. R. 1000.

Ratio procedendi.

Similia similibus solvuntur. Cum igitur Myrrha subiectum sit in morbum & solum, tale quoque menstruum, sc. V rectif. requirebatur. Θ η additum juvat & faciliat Extractionem, particulis suis acutis alium faciendo moleculis salsis V. haud aliter ac mechanici, pro meliori clavorum intrusione, tectebando prius ad alium parare solent.

Ufus

Tincturae huius adeo latè pater, ut D. LANGIO olim *Essentia salutis* dicta fuerit. Quid quod ab HELMONTIO ipsa myrrha pro corporis humani balsamo & vitae confortativo habeatur; quò etiam respexisse videtur Ma. ex Oriente venientes, & Salvatoris ihus, aurum & myrrham offerentes. Vi enim sua balsamica resistit omni putredini: unde loco preservativi contra Pestem à Paracelso commendata olim fuit Sierzigensibus. Quicquidmodum igitur tempore pestis & aliorum morborum contagiosorum Medicos nunquam agros visitare iubet ETTMULLERUS, nisi masticis & myrrhae masticatione prius se muniverint: ita pariter essentia & tinctura myrrhae hunc in finem aliis preservativi loco praescribi poterit: quam ipso, quo hæc scribo, anno, febre periculis Giffæ, (quo multes praesidiarii in ultima Landavi obliuione capti, per Galliam ducti & durissime habiti, tandem in Hassiam remissi eandem deportaverant) grassante & metum pestis inducente, arcani nomine venditando Practicus quidam, non sine foenore insigni, per schedulas publicas commendabat. Adhæc egregium expulsivum est in variolis & morbillis, catamenis & lochiis obstructis, unde & foetum demortuum potentissime expellit. Pro sanguine scorbutico depurgando seq. ratione eandem praescribit ETTMULLERUS:

℞. R. s. è scor. ʒij.

Myrrhae ʒj. M.

Dentur 30. vel 40. guttæ in vehiculo domestico aut appropriato.

In scabie idem

℞. R. aut essent. Myrrh. ʒij.

lignor. comp. ʒijj.

M. D. ad 40. guttas.

In stomacho aliisque visceribus roborandis & à verminosa putredine preservandis pariter valde prodest, eamque ob causam Elixir proprietatis PARACELSI ingreditur.

Externe laudatur in vulneribus & ulceribus antiquis, cumprimis fistulosis, ope siphonis injecta. Quia & in scorbutico oris vel sola, vel cum R. ligni sancti, aut, si hemorrhagia gingivarum insignior conjungitur, cum R. Lacæ maritima.

V.

Tinctura η extemporanea.

Hanc ante V & quod excurrit lustram in Laboratorio Regio ita parari vidi: Calcina verant sc. & in A. detinuerant Θ η per triiduum. huic adhuc calido & ferventi infundebant V. qui statim & in continenti colore rubicundo ungebatur.

Ratio procedendi.

Cum Tinctura hæc, ut alibi dictum fuit, potius salsis V. particulis quam Θ η tribuenda sit, hinc mirum non est eadem a Θ η per diuturnam & continuam hanc calcinationem & calorem actualem summe activo reddito & q. volatilifato statim resolvi, suamque Tincturam subito de se spargere, haud aliter ac talia volatilia cum A. digesta rubedinem induunt.

Ufus.

Tinctura η egregium medicamentum in obstructionibus Viscerum antiquis, malo hypochondriaco, alvo contumaciori, calculo & mensibus pellendis constituit. HARTMANNUS eandem tempore somni assumendam suadet: aut & tempore matutino & vesperti, aliisque horis Medicis sumi potest, & quidem à gutt. xx. ad xxx. in cerevisia, aut vino calido, vel alias vehiculis.

Potest misceri cum aliis appropriatis, sive nephriticis, v.g.

℞. Tinct. η .

Essent. σ . ana ʒij. M. D. gutt. xxx. ad xxx. in vehic. conven.

Vel

℞. Tinct. η .

℞. aa. ʒj.

Liq. nephrit. ex silic. Glanb. ʒij.

M. D. gutt. xxx. in η . saxifrag.

VI.

Aqua styptica. A.

℞. B. albi ʒij. dissolv. in

η . calid. lbj. Postmodum η .

O rubri ʒij. dissolve itid. in

η . calid. lbj.

Solutiones misce ac hanc per chartam Postmodum evaporentur ad dimidium: adde paululum solutionis Heliotropi tricocti, ad conciliandam Tincturam purpuream.

PARTITIO V.

De

SALIBUS QUIBUSDAM CHYMICIS.

I.

Tartarus solubilis.

℞. ζ . crud. pulverif. lbj.

⊖ $\frac{1}{2}$ lbk.

M. acolve in Fontan. piss. V. solutionem calefac in sartagine, cavendo, ne liquor, qui in supernamabit, extra sartagine emergat. Tandem trapiçiar per filtrum & evaporetur.

Ratio Processus.

Cum ζ ejusque cremor & crystalli non nisi in vehiculo calido solvantur, haud pauci verò emolliunt in vino aut cerevisia assumere ament, hinc illi combinatur sal ζ , quod facillimè solvitur in quo humido. Ubi tamen observandum est, ut statim sub ipsa solutione dum adhuc quodammodo ebullit, absorbeatur, cum ζ depuratus facillime connubium \ominus ζ deleat & fundum petat.

Ufus

ζ solubilis est egregius pro digestivo & laxativo in hypochondriacis, quibus cremor & crystalli aciditate sua tormina sepe movent, quæ in ζ solubili corrigitur per \ominus ζ alcalinum. Absorbet autem gastriciæ pituitam, ventriculum & intestina obfidentem, & blandâ irritatione alvum laxat. Unde in cura acutissimarum, si forte alvus contumacior reddatur, salutaris ejusdem usus est, cum operatio acidularum per secessum juvet. Datur à \mathfrak{z} . ad 3ß. in poculo vini.

II.

Tartarus solatus.

℞. Spirit. \ominus .

℞. ζ . p. d. ana.

M. & cessante ebullitione affunde ζ aquæ. q. f. evapora ad medietatem & repone, ut concresecant crystalli, quos exime, iterum evapora, idem toties repete, donec omnem ζ solatum exemeris.

Ratio procedendi.

Cum \sim \ominus nitium acidus & corrosivus sit, hinc per additionem \mathfrak{z} ζ per deliq. tanquam \ominus alcali contrariis cicurandus erat; adeoque duo hæc proportionem anacâ maritata sal tertium, quod neutrum & enixum vocant alij, exurgit, & de utroque participando mediam, saltem & abstergentem qualitatem nanciscitur.

Ufus.

Tartarum hunc solatum laudatus sæpius EITMULLERUS in Comment. Schroed. de rebus & universale digestivum ante purgationem pro affectibus ventriculi & intestinorum vocat. ad aperitvum primarum viarum. Saporem enim suo salso & vi nonnihil laxativa & diuretica miscuit abstergit & temperat; hinc in morbis chronicis remedium merito laudandum est. Observat idem, quod si ζ per \mathfrak{z} . ad 3ß. purgantibus miscetur, dimidia salum horum dosi sit sumenda, quoniam $\frac{1}{2}$ per se hanc vim proutandi alvum & dissolvendi præstare ad excretionem.

III.

\ominus fixum.

℞. \ominus

ζ ana.

Pulverif. & M. Hæc materia per vices in crucibulum candens & deflagratione finitâ remanebit sal, quod nequaquam deflagrabit in prunas injectum.

Ratio procedendi.

Cum \ominus nihil aliud sit quam \ominus compositum ex \ominus alcali & spiritu acido sulphureo, hunc, si al calicem flo de idemimus, spiritus acidus ex eo abigendus est, si ve per accensionem cum carbonibus, si ve per detonationem cum albis subjeçtis \mathfrak{z} reis: unde post croci metallorum & \mathfrak{z} diaphanissimi purgationem illud \ominus ans obtinetur. Ut verò omnes \sim acidi particule, si quæ post accensionem remaneant, penitus enerventur, non sine \ominus Autoruol \mathfrak{z} adject ζ , sub calcinatione \ominus luum fixum patiter ζ peditanem & acidum illud magis corrigentem.

Usus

Hujus Θ . Chymicis admodum proficiuus & expectus est ad plures solutiones instruendas, adeo quidem, ut GLAUBERUS liquorem exinde per deliquium paratum pro decantato liquore *Alkegi* vendicare non dubitaverit.

IV.

Arcanum Duplicatum.

Hoc nihil aliud est quam Θ extractum e capite mortuo aquæ fortis. Est sc. Sal neutrum, ex parte fixiore Θ & Θ . Pro hæ operatione caput mortuum minutissimè pulverisatur, solvitur in ∇ . filtratur & evaporatur in tartagine ferreâ, remanetque Sal fixum, quod vocatur Θ ex duobus, *Arcanum duplicatum* Mynsichti & *Panacea Holfatica*. Aliiter autem à D. LUDOVICO paratur ita:

ꝯ. Θ . lib. j. Solvatur in

∇ . calid lib. iij. Solutio fletretur, & infundatur

Θ fixi in aq. font. \bar{z} vij. solut. & præcipitabitur terra Θ . Hinc liquor per chartam filtrandus est, ut remaneat terra, quæ exsiccanda. Postmodum liquor evaporetur, & remanebit Θ . arcanum duplicatum dictum, quod in crucibulo reverberandum.

Ratio Processus.

In utraque operatione Sal fixum Θ attripit acidum Θ . sicque ætat metallum, simul tamen partem Θ metallicam aggreiens & aliquid de Θ ejus fixo & anodyno attripiens tandem in Θ salium seu enixum abit.

Usus

Intus non tantum convenit cum aliorum salium mediorum qualitate absterfiva & diuretica, sed & Θ in tuitayim possidet anodynâ & somniferam in vigiliis diurnis aliisque affectibus. Hinc optimum est remedium in affectibus chronicis, malo hypoch. scorburo, febribus intermittentibus & continuis letatis omnibusque lymphæ per vasâ & reus abundantis, it. in suppressione mensium, deliriis melanchol. & mania. Dos. \bar{z} j.

PARTITIO VI.

De

MAGISTERIIS.

I.

Lac Sulphuris.

ꝯ. Δ subtilissimè triti,

Θ \bar{z} ana.

Liquentur in vase fictili vitreato, hinc coq. in ∇ . font. Hanc ∇ . filtra per chartam & infilla acetum, sic præcipitabitur ad fundum pulv. albicans, Lac Δ . dictus.

Ratio procedendi.

Contraria contrariis præcipitantur: quæ Regula in Magisteriorum præparatione potissimum observanda est. Cum igitur Θ \bar{z} sub eoditione roslerit sibi quæ junxerit Δ particulas, hinc illi, seu alcalino subjecto, menstruum seu potius præcipitans contrarium, sc. acidum, opponendum erat, quod Θ \bar{z} devorando particulas Δ à compedibus liberat & separat, quæ sua gravitate fundum petunt. Colorem autem albicantem harum particularum BARNERUS à duplici causâ derivat, primò à salibus, & 2. ab aère; adeoque Lac vocatur Magisterium, non ratione consistentiæ, sed ratione coloris, quod in inscriptione formularum observandum, ne cum ineptis Candidans illud pro liquore habeamus.

Usus.

Decantatum est in plurimis affectibus pectoris, tussi, asthma, phthisi, scabie item & affectibus cutaneis internè & externè. Ass licet non omni virtute balsamica destitutum & ita non omnino pro calce merite habendum sit, certum tamen est, quod virtus illa maximè castata sit, adeo ut \bar{z} j. florum Δ aut Δ com. purioris plus agat, quam \bar{z} j. Magisterii.

Hinc ETTMULLERUS alium, eumque convenientiorem, habet modum Lac Δ absque acido parandi, quando balsamum Δ ad extracti consistentiam inspissatum extrahit cum ∇ . rectificato & abhinc præcipitat eom ∇ simplici. Convenit non tantum in Phthisi, sed & in Pelle rotulis præservativis misceri potest. Exterac Varos curat & colimeticum est.

II.

Refina Jalappæ & Scammonæi.

- ℞ Jalapp aut Scammon. contrit. q plac affunde V. redif q. f. & extrahetur Refina. Soli noni filtratæ affundatur V. cont. & Refina fundum paret. Si non vult igne leno in Alembico vitreo denuo abstrahere potens. Postmodum Refina eximit aliquoties lavatur aquâ, priorem rejicendo & novam affundendo. Denique exsiccat & usui servatur. Eodem modo proceditur in aliis Refinis parandis.

Ratio procedendi.

Quum Refina horum subjectorum sit naturæ siccæ, hinc per simile menstruum, sc. V. rectificatum extrahenda erat; & cum siccum nihil magis sit contrarium quam aqua communis, quæ illi resistere nequit, hinc per huius affusionem poni in menstruo ampliores reddit solutum amplius continere nequeunt, sed ad fundum secedere permittunt; quod facile in majori copia obtinetur, si Refina in radice jalappæ quodammodo extraverit sit, & splendore se prodar.

Usus

Horum Magisteriorum idem est qui simplicium, hæc tamen cum distinctione, quod Refina Jalappæ in minore quantitate & fortius, quàm mixtum integrum: Refina Scammonia autem minus & debilius, quàm mixtum integrum, sub eadem dosi, agant. Quod enim Rad. Jalappæ 3j efficit hoc Resina Jalappæ 3ss præstare valet, quæ communis ejus dosi est. Aliter autem res se habet cum Scammonia, quod in substantia vix ultra grana quædam tuto datur, cum tamen Resinæ duplum propinat possit. Rationem in Sal. particulis sulphureis combinarum, rejicit WILLISIUS, quod sub extractione Scammonici maximam ad partem evasisse, in solutione verò Jalappæ permanisse docet, unde & Resinæ hæc saporem acrorem habentes fortius operari & purgare solent. Conveniunt autem ad eliminandum serum & aquas hydropicorum alisque in affectibus, à colluvie serosa oriundis.

III.

Magisteria Testaceorum.

- ℞ Testarum Ostrearum bene lotarum, & in mort. contrit. q. v. & in vase vitreo vel stannino superaffunde ~ 3 Philosophicum, vel acetum destillatum. Repone in ~ positionem per bidduum vel triduum, donec menstruum particulis solutis probe fuerit imprægnatum, cujus signum est, quando affuso ~ per deliq. solutio lactæa. Tum solutionem filtra & affunde 3 7 p. d. vel ~ 3 & Magisterium testaceorum ad fundum præcipitabitur, à liquore ope decantationis separandum.

Ratio procedendi.

Cum corpora ejusmodi testacea ad extractionem propriè sic dictam sint inepta: hinc ~ 3 Phil. aut ~ illis affunditur, ut saltem rodar & abraðar quisdam illarum particulas. Quamprimum autem liquor menstruo contrarius, 3 7 aut ~ 3 & affunditur, oritur effervescencia atque lucta inter utrumque, sub cujus motu pori solventis majorem panciscuntur diametrum, adeo, ut ~ 3 testaceorum abraðe illis excidant, & ad fundum secedant.

Usus

Horum Magisteriorum nullus aut perquam exiguus est. Cum enim omnia ~ 3 modi marina & testacea porissimum acidum abso. sendo agant, hinc acido extra corpus humanum imbuta, & ~ 3 loquantur, saturata, acidum paritè in corpore humano oberrans non amplius attingunt. Præstat ergo simplicibus & integris adhuc nri, quàm castratis.

Nec obstat ratione Salis, à menstruo illis adhzrentis, istis vim quandam saponariam, abstergentem aut deobstruentem competere:

- ℞. Habemus enim alia deterfiva magis tuta, cum salia à menstruis his quodammodò corrosiva sint, & quia nulla arte omnino possunt elui, hinc mirum non est, quod post usum Magisteriorum illorum, etiam precutiorum, sc. perlarum & coralliorum, ventriculus quandoque corrosus inventus fuerit.

| | | | | | |
|----------------------|--------|--------------------|--------|------------------|---------|
| <i>Tragesianon</i> | Pag. 7 | <i>Veratrum</i> | Pag. 6 | <i>Valeriana</i> | Pag. 20 |
| <i>Tibialis</i> | 6 | <i>Verbascum</i> | 2 | <i>Valeriana</i> | 10 |
| <i>Trichomanes</i> | 16 | <i>Verbena</i> | 4 | | |
| <i>Trifolium</i> | 10 | <i>Veronica</i> | 2 | X. | |
| <i>Trisicum</i> | 15 | <i>Viburnum</i> | 22 | | |
| <i>Tabera</i> | 17 | <i>Vicia</i> | 10 | Xanthion | 12 |
| <i>Tubularia</i> | ibid. | <i>Viola</i> | 11 | Xeranthemum | 14 |
| <i>Tulipa</i> | 9 | <i>Virga aurea</i> | 14 | Xiphion | 9 |
| <i>Turritis</i> | 5 | <i>Viscum</i> | 20 | Xylon | 1 |
| <i>Tussilage</i> | 14 | <i>Vitex</i> | ibid. | Xylosteon | 10 |
| <i>Typha</i> | 15 | <i>Vitis</i> | 24 | | |
| | | <i>idea</i> | 10 | Z. | |
| V. | | <i>Ulmaria</i> | 6 | | |
| <i>Valeriana</i> | 2 | <i>Ulmus</i> | 10 | Z. Acintha | 13 |
| <i>Valeriantilla</i> | ibid. | <i>Urtica</i> | 15 | Ziziphos | 21 |

FINIS.

SPHALMATA ILLAPSA.

Pag. 6. Col. 1. lin. 2. loco verb. IX. Genera lege IX. Sectiones.
Pag. 33. Lin. 7. loco Cathartica lege Cathartica.




Adm. 111-2436

21

2

2

2



XXIII.

X